

血栓溶解療法 (EMA001)

ステップ名称		手術後1日目	4日目	2日目	3日目	
		1日目	2日目	3日目	4日目	
患者状態		■ 易出血性の症状・所見がない ・皮下出血の症状がない	■ 全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない	■ 全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない	■ 全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない	
		■ 全身状態に問題がない ・バイタルサインに異常がない	■ 神経症状・所見がない ・麻痺がない ・瞳孔異常がない	■ 神経症状・所見がない ・麻痺がない ・瞳孔異常がない	■ 神経症状・所見がない ・麻痺がない ・瞳孔異常がない	
		■ 中枢神経障害の症状・所見がない ・意識レベルの低下がない	■ 中枢神経障害の症状・所見がない ・意識レベルの低下がない	■ 中枢神経障害の症状・所見がない ・意識レベルの低下がない	■ 中枢神経障害の症状・所見がない ・意識レベルの低下がない	
投薬						
注射		t PA 静注	点滴をおこないます	点滴をおこないます	点滴をおこないます	
		点滴をおこないます	点滴をおこないます	点滴をおこないます	点滴をおこないます	
		点滴をおこないます				
処置		指に酸素濃度を測定する器械を装着します	指に酸素濃度を測定する器械を装着します	指に酸素濃度を測定する器械を装着します	指に酸素濃度を測定する器械を装着します	
		リハビリを行っていきます	リハビリを行っていきます	リハビリを行っていきます	リハビリを行っていきます	
医師	指導					
	指示	心電図モニターを装着し、状態の観察をおこないます	心電図モニターを装着し、状態の観察をおこないます	心電図モニターを装着し、状態の観察をおこないます	心電図モニターを装着し、状態の観察をおこないます	
		状態の観察を15分から1時間毎におこないます	状態の観察を1～2時間毎におこないます	適宜状態の観察をおこないます	適宜状態の観察をおこないます	
		医師の指示あるまで飲んだり食べたりできません	医師の指示あるまで飲んだり食べたりできません	医師の指示あるまで飲んだり食べたりできません	医師の指示あるまで飲んだり食べたりできません	
対症指示						
検査	検体検査		朝採血があります			
	生理検査					
	放射線		頭部CTがあります			
	その他					
輸血						
手術						
看護	日常生活ケア	清潔	暖かいタオルで体拭きをします。	暖かいタオルで体拭きをします。	暖かいタオルで体拭きをします。	暖かいタオルで体拭きをします。
		歯磨きをします。	歯磨きをします。	歯磨きをします。	歯磨きをします。	
		寝巻きを交換します	寝巻きを交換します	寝巻きを交換します	寝巻きを交換します	
	排泄					
	その他					
指導・教育						
観察	全身状態の観察をします	全身状態の観察をします	全身状態の観察をします	全身状態の観察をします		
その他						
食事						
栄養指導						
リハビリ		リハビリを開始します				
文書		入院に関する説明をします				
カルテ	医師 看護師 コメディカル					
コメント		オリエンテーション				
指導料・加算						