

ERCP (GAS001)

ステップ名称		入院		検査当日		
		1日前		基準日		
		検査前日		検査前	検査中	
患者状態		■ 身体的準備ができている ・ 抗血小板剤・抗凝固剤が予定通り中止されている		■ 合併症の症状・所見がない ・ 背部痛がない ・ 腹痛がない ■ 疼痛のコントロールができている ・ 鎮痛処置により疼痛を緩和することができる		
知識・教育・理解		■ 検査について理解できる ・ 説明内容に疑問・不信感の表出がない		■ 治療について理解できる ・ 床上で安静が守れている		
投薬						
注射				午前中に点滴します	注射をします	
医師	処置					
	指導					
	指示	入院時検温をします。		検温をします。		
		トイレ・洗面のみ行けます		トイレ・洗面のみ行けます		
		21時以降絶食です。水分はとれます		10時まで水分がとれます以降、絶食です		
対症指示	21時以降絶食となり、水分のみ摂取できます		朝の薬は服用してください 昼から内服中止です			
	休止薬以外の内服薬はこれまでのものを続行して下さい。		午前中、看護師が点滴確保を行います			
検査	検体検査	必要に応じて採血の検査があります				
	生理検査					
	放射線			検査は、通常、午後に行います 1. 歩行または車椅子で検査室まで行きます 2. のどの麻酔をします 3. 肩に痛剤と安定剤の注射をします 4. マウスピースをくわえ、テープ固定します 5. 治療用のベットにうつ伏せに寝ます 6. 点滴から安定剤を注射します 7. 内視鏡を挿入し、膵・胆管の造影を行います 8. 必要に応じて追加の治療・処置を行う場合があります 9. 移動用ベットで帰室します		
	その他			ERCP or EST		
輸血手術						
看護	日常生活ケア	清潔	自宅で入浴してきてください		午前中に清拭を行います	
		排泄	トイレ歩行できます		トイレ歩行できます 治療前に排泄を済ませてください	
		その他				
	指導・教育	クリニカルパスの説明をします		クリニカルパスの説明をします		
		抗血小板薬・抗凝固剤を服用中の方は、休薬されているか確認します 休止薬 ()		義歯・ヘアピン・時計・指輪などの貴金属類は外してください		
	観察	入院までに化粧・マニキュアはとってきてください。				
入院までに爪は短くしてきてください						
食事		膵臓食です		絶食です		
栄養指導						
リハビリ						
文書						
カルテ	医師					
	看護師 コメディカル					
コメント						
指導料・加算						

ERCP (GAS001)

ステップ名称		検査当日	検査後 1 日目
		基準日	1日後
		検査後	
患者状態		<ul style="list-style-type: none"> ■合併症の症状・所見がない <ul style="list-style-type: none"> ・背部痛がない ・腹痛がない ■疼痛のコントロールができています ・鎮痛処置により疼痛を緩和することができます 	<ul style="list-style-type: none"> ■合併症の症状・所見がない <ul style="list-style-type: none"> ・出血がない ・嘔気がない ■疼痛のコントロールができています ・鎮痛処置により疼痛を緩和することができます
知識・教育・理解		<ul style="list-style-type: none"> ■治療について理解できる ・床上で安静が守れている 	
投薬			
注射		 肺炎予防の点滴と補液のための点滴をします。	 補液のための点滴が終了したら針を抜きます
医師	処置	 心電図モニターを装着します  指に酸素濃度モニターをつけます	
	指導		
	指示	 適宜検温します  帰室後2時間はベット上で安静です その後トイレ歩行できます 検査が終わってから2時間経つと水分がとれます 術後、初めて水分を摂取するときは、看護師がお手伝いします 一人では飲まないで下さい 必要時、酸素を流量します	 適宜検温します  トイレ・洗面のみ行けます
	対症指示	 治療後痛み・出血などの症状がある時はすぐに医師・看護師にお知らせください  ERCPパス中腹痛疼痛時指示 ERCPパス中嘔吐嘔気時指示	 治療後痛み・出血などの症状がある時はすぐに医師・看護師にお知らせください  ERCPパス中腹痛疼痛時指示 ERCPパス中嘔吐嘔気時指示
検査	検体検査		 朝に採血があります
	生理検査		
	放射線		
	その他		
輸血			
手術			
看護	日常生活ケア	清潔	 清拭できます
		排泄	 帰室後2時間はベット上で排泄となります その後トイレ歩行可です  トイレ歩行できます
		その他	
	指導・教育	 クリニカルパスの説明をします  クリニカルパスの説明をします 医師の指示で今までの内服していた薬を再開してください 抗血小板薬・抗凝固剤などは指示があるまで中止してください 休止薬 ()	
観察	 症状の観察を行います	 症状の観察を行います	
	その他		
食事		 翌朝まで絶食です。	 採血結果がよければ昼食から食事ができます
栄養指導			
リハビリ			
文書			
カルテ	医師		
	看護師 コメディカル		
コメント			
指導料・加算			