

内視鏡的下部消化管粘膜下層切除・剥離術(大腸ESD)（GAS006）

ステップ名称			入院日	治療当日		
			1日前	基準日		
				手術前	手術中	手術後
患者状態			■ 身体的準備ができている ・ 抗血小板剤・抗凝固剤が予定通り中止されている	■ 合併症の症状・所見がない ・ 出血がない ・ 背部痛がない ・ 腹痛がない		
				■ 疼痛のコントロールができている ・ 鎮痛処置により疼痛を緩和することができる		
知識・教育・理解			■ 治療について理解できる ・ 説明内容に疑問・不信感の表出がない	■ 治療について理解できる ・ 床上で安静が守れている		
投薬			 下剤内服	 朝から下剤を内服します		
注射				 点滴をします	 注射をします	 点滴をします
医師	処置		 適宜、検温を行います	 適宜、検温を行います		 帰室後、1時間毎に3時間経過するまで検温を行います
				 弾性ストッキングをはきます		 心電図モニターを装着します
				 治療前に点滴をいれます		 指に酸素濃度モニターをつけます
	指導					
		指示		 休止薬以外の内服薬は今までのものを続行して下さい。	 休止薬以外の朝のお薬は服用してください 午前10時以降のお薬は中止してください	
			 21時以降絶食となり、水分のみ摂取できます	 10時まで水分摂取できます		 トイレ歩行出来たら尿を出すための管を抜きます
				 午前中に尿を出す管を入れます		必要時、酸素を流量します
	対症指示					 治療後以痛み、吐き気、出血などの症状がある時はすぐに医師・看護師にお知らせください
検査	検体検査		 必要に応じて採血を行います			
	生理検査		 必要に応じて心電図検査を行います			
	放射線		 必要に応じて胸部レントゲンを行います			
	その他				通常午後到大腸ESDを行います	
輸血手術						
看護	日常生活ケア	清潔	 自宅で入浴してきてください	 清拭できます		
				 検査着に着替えます		
		排泄	 トイレに行けます	 トイレに行けます		 3時間は床上排泄です その後トイレに行けます
		その他				
	指導・教育		 クリニカルパスの説明をします	 指輪・コンタクトレンズ・義歯などをはずします。		 クリニカルパスの説明を行います
			 検査・治療承諾書の確認をします	 クリニカルパスの説明をします		
			 抗血小板薬・抗凝固剤を服用中の方は、休薬されているか確認します 休止薬（ ）			
			 入院までに化粧・マニキュアはとってきてください			
			 入院までに爪は短くしてきてください			
	観察		 適宜、症状の観察を行います	 適宜、症状の観察を行います	 適宜、症状の観察を行います	 適宜、症状の観察を行います
	その他		 弾性ストッキングのサイズを測定します			
食事		 低残渣食です 21時以降絶食です 水分のみ摂取できます	 朝から絶食です	 絶食です	 絶飲食です	
栄養指導 リハビリ 文書						
カルテ	医師 看護師 コメディカル					
コメント						
指導料・加算						

内視鏡的下部消化管粘膜下層切除・剥離術(大腸ESD)（GAS006）

ステップ名称			術後 1 日目	術後 2 日目	術後 3 日目	術後 4 日目
			1日後	2日後	3日後	4日後
患者状態			■合併症の症状・所見がない ・出血がない	■合併症の症状・所見がない ・出血がない	■合併症の症状・所見がない ・出血がない ・腹痛がない	■合併症の症状・所見がない ・出血がない ・腹痛がない
			■貧血の症状・所見がない ・ヘモグロビン	■疼痛のコントロールができてい る ・鎮痛処置により疼痛を緩和すること ができる		
			■疼痛のコントロールができてい る ・鎮痛処置により疼痛を緩和すること ができる			
知識・教育・理 解						■日常生活の注意点について理解でき る ・退院後の日常生活のわからないこと を聞くことができる
投薬						
注射			 点滴をします	 点滴をします	 点滴をします	
医師	処置		 適宜、検温を行います	 適宜、検温を行います	 適宜、検温を行います	 適宜、検温を行います
	指導					
	指示		 トイレ、洗面所のみ行けます	 トイレ、洗面所のみ行けます	 病棟内は自由です	
			 朝から水分がとれます	 医師の指示にて内服再開となります	 点滴終了後、針を抜きます	
検査	対症指示		 治療後以痛み、吐き気、出血などの 症状がある時はすぐに医師・看護 師にお知らせください	 治療後以痛み、吐き気、出血などの 症状がある時はすぐに医師・看護 師にお知らせください	 治療後以痛み、吐き気、出血などの 症状がある時はすぐに医師・看護 師にお知らせください	
	検体検査		 採血があります			
	生理検査					
	放射線 その他					
輸血 手術						
看護	日常生活ケア	清潔	 介助で全身清拭できます	 介助で全身清拭できます	 シャワー浴できます	
		排泄	 トイレに行けます	 トイレに行けます	 トイレに行けます	 トイレに行けます
		その他				
	指導・教育		 クリニカルパスの説明を行います	 クリニカルパスの説明を行います	 クリニカルパスの説明を行います	 クリニカルパスの説明を行います
	観察		 適宜、症状の観察を行います	 適宜、症状の観察を行います	 適宜、症状の観察を行います	 適宜、症状の観察を行います
	その他					
食事			 絶食です	 朝から低残渣食が始まります 朝：七分粥 昼：全粥 夕：常食	 低残渣食です	 低残渣食です
栄養指導 リハビリ 文書						
カルテ	医師					
	看護師 コメディカル					
コメント						
指導料・加算						