

# 腹部血管造影(TACE/TAIを含む) (GAS008)

ステップ名称		入院		検査当日				
		1日前		基準日				
		検査前日		検査前	検査中	検査後		
患者状態		<ul style="list-style-type: none"> <li>身体的準備ができています</li> <li>検査値が許容範囲である</li> <li>抗血小板剤・抗凝固剤が予定通り中止されている</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>合併症の症状・所見がない</li> <li>皮下に血腫がない</li> <li>出血がない</li> <li>嘔吐がない</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>身体的準備ができています</li> <li>体温【適正值：≤38.0℃】</li> <li>抗血小板剤・抗凝固剤が予定通り中止されている</li> <li>禁煙ができています</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>発熱がない</li> <li>体温【適正值：≤38.0℃】</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>創部に問題がない</li> <li>ガーゼの必要がない</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>疼痛のコントロールができています</li> <li>鎮痛処置により疼痛を緩和することができる</li> </ul>				
知識・教育・理解		<ul style="list-style-type: none"> <li>検査について理解できる</li> <li>説明内容に疑問・不信感の表出がない</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>治療について理解できる</li> <li>床上で安静が守れている</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>手術について理解できる</li> <li>説明内容に疑問・不信感の表出がない</li> <li>入院経過を言える</li> </ul>				
投薬								
注射				午前中に点滴します	注射をします	点滴があります		
医師	処置				通常午後に腹部血管造影を行います	心電図モニター、パルスオキシメーターを装着します		
	指導					適宜検温します		
	指示		薬を飲まれている方は、看護師へお知らせください。休止薬以外の内服薬はこれまでのものを続行して下さい。適宜、検温をします	12時まで水分摂取できます以降絶食です				
			21時以降絶食です水分のみ摂取できます	休止薬以外の内服薬は朝まで今までのものを続行して下さい。昼以降内服は中止です	休止薬以外の内服薬は朝まで今までのものを続行して下さい。昼以降内服は中止です	休止薬以外の内服薬は朝まで今までのものを続行して下さい。昼以降内服は中止です		
			院内歩行可能ですが、極力病棟内で過ごして下さい	午前中、看護師が点滴確保を行います	午前中に尿を出す管を入れます		帰室後4時間は仰臥位保持です以後トイレのみ歩行できます	
			院内歩行可能ですが、極力病棟内で過ごして下さい	弾性ストッキングをはきます			帰室後4時間は床上排泄、以後バルーン除去、トイレ歩行のみ可。	
			原則治療は午後から開始します				帰室4時間後に尿を出す管を抜きます。ただし、帰室が遅い場合は翌日の昼間に抜きます	
	対症指示					治療後痛み・出血などの症状がある時はすぐに医師・看護師にお知らせください 治療後悪寒などの症状がある時はすぐに医師・看護師にお知らせください		
	検査	検体検査	必要に応じて採血の検査があります。					
		生理検査	必要に応じて心電図検査があります					
放射線		必要に応じて胸部レントゲン検査があります			通常午後に腹部血管造影を行います			
その他					腹部血管造影			
輸血								
手術								
看護	日常生活ケア	清潔	自宅で入浴してきてください	治療前に検査着に着替えます。				
		排泄	トイレ歩行可です。	午前中に清拭を行います				
		その他	トイレ歩行可です。治療前に排泄を済ませてください			4時間はベッド上で排泄しますその後トイレへ行くことができます		
	指導・教育		クリニカルパスの説明をします	クリニカルパスの説明を行います		クリニカルパスの説明を行います		
			抗血小板薬・抗凝固剤を服用中の方は、休薬されているか確認します。休止薬( )	義歯・ヘアピン・時計・指輪などの貴金属類は外して下さい		治療後痛み・出血などの症状がある時はすぐに医師・看護師にお知らせください。		
	観察	入院までに化粧・マニキュアはとってきてください。	入院までに爪は短くしてきてください					
	その他	適宜、症状の観察をします	適宜、症状の観察をします			適宜、症状の観察をします		
食事	弾性ストッキングのサイズを測定します。	両足の足背動脈をマーキングします						
食事	肝臓食です		肝臓食です	昼は絶食です	夕から肝臓食です			
栄養指導								
リハビリ								
文書								
カルテ	医師							
	看護師 コメディカル							
コメント								
指導料・加算								

# 腹部血管造影(TACE/TAIを含む) (GAS008)

ステップ名称		検査後 1-3日目			
		1日後	2日後	3日後	
患者状態		<ul style="list-style-type: none"> <li>■合併症の症状・所見がない                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・皮下に血腫がない</li> <li>・出血がない</li> <li>・嘔吐がない</li> </ul> </li> <li>■疼痛のコントロールができています                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・鎮痛処置により疼痛を緩和することができる</li> </ul> </li> </ul>			
知識・教育・理解		<ul style="list-style-type: none"> <li>■日常生活の注意点について理解できる</li> <li>・退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる</li> </ul>			
投薬					
注射		点滴があります			
医師	処置				
	指導				
	指示		適宜検温します		
			医師の指示で休止薬（抗血小板薬・抗凝固剤等）の内服の再開について説明します。	医師の指示で休止薬（抗血小板薬・抗凝固剤等）の内服の再開について説明します。	医師の指示で休止薬（抗血小板薬・抗凝固剤等）の内服の再開について説明します。
			院内歩行可能ですが、極力病棟内で過ごしてください	院内歩行可能ですが、極力病棟内で過ごしてください	院内歩行可能ですが、極力病棟内で過ごしてください
対症指示	治療後痛み・出血などの症状がある時はすぐに医師・看護師にお知らせください 治療後悪寒などの症状がある時はすぐに医師・看護師にお知らせください				
検査	検体検査	必要に応じて採血の検査があります。			
	生理検査				
	放射線				
	その他				
輸血					
手術					
看護	日常生活ケア	清潔	清拭ができます		
		排泄	トイレ歩行できます		
		その他			
	指導・教育		クリニカルパスの説明を行います 治療後痛み・出血などの症状がある時はすぐに医師・看護師にお知らせください。		
		観察	適宜、症状の観察をします	適宜、症状の観察をします	適宜、症状の観察をします
		その他			
食事		肝臓食です			
栄養指導					
リハビリ					
文書					
カルテ	医師				
	看護師 コメディカル				
コメント					
指導料・加算					