

出血性消化性潰瘍 (GAS013)

ステップ名称		治療当日	術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目	術後5日目	
		基準日	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	
		手術後						
患者状態		<ul style="list-style-type: none"> ■合併症の症状・所見がない ・出血がない ・嘔気がない ・嘔吐がない 	<ul style="list-style-type: none"> ■合併症の症状・所見がない ・出血がない ・嘔気がない ・嘔吐がない 	<ul style="list-style-type: none"> ■合併症の症状・所見がない ・出血がない ・嘔気がない ・嘔吐がない 	<ul style="list-style-type: none"> ■合併症の症状・所見がない ・出血がない ・嘔気がない ・嘔吐がない ・心窩部痛がない 	<ul style="list-style-type: none"> ■合併症の症状・所見がない ・出血がない ・嘔気がない ・嘔吐がない ・心窩部痛がない 	<ul style="list-style-type: none"> ■合併症の症状・所見がない ・出血がない ・嘔気がない ・嘔吐がない ・心窩部痛がない 	
		<ul style="list-style-type: none"> ■疼痛のコントロールができています ・鎮痛処置により疼痛を緩和することができる 	<ul style="list-style-type: none"> ■貧血の症状・所見がない ・ヘモグロビン 	<ul style="list-style-type: none"> ■疼痛のコントロールができています ・鎮痛処置により疼痛を緩和することができる 				
知識・教育・理解		<ul style="list-style-type: none"> ■治療について理解できる ・床上で安静が守れている 					<ul style="list-style-type: none"> ■日常生活の注意点について理解できる ・退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる 	
投薬				 胃薬を夕食後から内服します				
注射		 点滴をします	 点滴をします	 点滴をします	 点滴をします			
医師	処置	 心電図モニターを装着します  指に酸素濃度モニターをつけます						
	指導							
	指示	 検温を帰室した時、その後1時間毎に行います。	 適宜、検温をします	 適宜、検温をします	 適宜、検温をします	 適宜、検温をします	 適宜、検温をします	
		 3時間はベッド上安静です その後ポータブルトイレへ行くことができます	 ポータブルトイレでの排泄になります 内視鏡で止血確認後にトイレ・洗面歩行ができます	 洗面所まで行くことができます	 病棟内は自由に歩行できます	 病院内自由に歩行できます	 病院内自由に歩行できます	
		 胃カメラが終わってから2時間経つと水分がとれます 術後、初めて水分を摂取するときは、看護師がお手伝いします 一人では飲まないで下さい 翌日検査のため、21時より絶飲食です	 胃カメラが終わってから、止血確認できていれば2時間経つと水分がとれます 術後、初めて水分を摂取するときは、看護師がお手伝いします 一人では飲まないで下さい	 医師の指示にて持参薬が再開になります				
 必要時、酸素を流量します  検査前に検温を行います  外来から点滴確保しています。								
対症指示								
検査	検体検査		 朝に採血があります					
	生理検査							
	放射線							
	その他	 入院前に胃カメラを行います。	 午前中に胃カメラがあります					
輸血								
手術								
看護	日常生活ケア	清潔	 介助で全身清拭できます	 介助で全身清拭できます	 シャワー浴ができます	 入浴できます	 入浴できます	
		排泄	 ベッド上、ポータブルトイレでの排泄になります。	 ポータブルトイレでの排泄になります 内視鏡で止血確認後にトイレ・洗面歩行ができます	 トイレに行けます	 トイレに行けます	 トイレに行けます	 トイレに行けます
		その他						
	指導・教育	 クリニカルパスの説明をします	 クリニカルパスの説明をします	 クリニカルパスの説明をします	 クリニカルパスの説明をします	 クリニカルパスの説明をします	 クリニカルパスの説明をします	
	観察	 治療後、適宜症状がないか確認します	 治療後、適宜症状がないか確認します	 治療後、適宜症状がないか確認します	 治療後、適宜症状がないか確認します	 治療後、適宜症状がないか確認します	 治療後、適宜症状がないか確認します	
その他	 午前中に検査着に着替えます  タオルを1本用意してください	 タオルを1本用意してください  午前中に検査着に着替えます						
食事	 絶食です	 絶食です	 昼から胃潰瘍食三分粥が始まります その後常食まで2食ずつ上がっていきます	 朝・昼食は 胃潰瘍食五分粥 夕食は 胃潰瘍食七分粥が提供されます。	 朝食は 胃潰瘍食七分粥 昼・夕食は 胃潰瘍食全粥が提供されます。	 朝・昼食は 胃潰瘍食軟飯 夕食は 胃潰瘍食中米飯が提供されます。		
栄養指導								
リハビリ								
文書								
カルテ	医師 看護師 コメディカル							
コメント								
指導料・加算								