





R-CHOP療法<初回導入用 21日間> (HEM005)

ステップ名称		入院1日目	入院2日目	入院3日目	入院4日目	入院5日目	入院6日目	入院7日目
		1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
		化学療法前日	day1	day2	day3	day4	day5	day6
患者状態				<ul style="list-style-type: none"> ■カテーテル管理に問題がない ・注射部位の疼痛・腫脹・かゆみ・紅斑がない 	<ul style="list-style-type: none"> ■全身倦怠感がない ・治療前より疲労が増すが日常生活には変化がない 	<ul style="list-style-type: none"> ■全身倦怠感がない ・治療前より疲労が増すが日常生活には変化がない 	<ul style="list-style-type: none"> ■全身倦怠感がない ・治療前より疲労が増すが日常生活には変化がない 	<ul style="list-style-type: none"> ■全身倦怠感がない ・治療前より疲労が増すが日常生活には変化がない
知識・教育・理解		<ul style="list-style-type: none"> ■治療について理解できる ・治療に対する不安の訴えがない ・説明内容に疑問の表出がない 	<ul style="list-style-type: none"> ■治療について理解できる ・化学療法中のチューブ類・ポンプの取り扱いを言える 	<ul style="list-style-type: none"> ■治療について理解できる ・化学療法中のチューブ類の取り扱いを言える ・服薬ができる ■有害事象について理解できる ・有害事象出現時に報告できる 	<ul style="list-style-type: none"> ■治療について理解できる ・化学療法中のチューブ類の取り扱いを言える ・合併症の予防方法を言える ■有害事象について理解できる ・有害事象出現時に報告できる 	<ul style="list-style-type: none"> ■治療について理解できる ・化学療法中のチューブ類の取り扱いを言える ・合併症の予防方法を言える ■有害事象について理解できる ・有害事象出現時に報告できる 	<ul style="list-style-type: none"> ■治療について理解できる ・合併症の予防方法を言える ■有害事象について理解できる ・有害事象出現時に報告できる 	<ul style="list-style-type: none"> ■治療について理解できる ・合併症の予防方法を言える ■有害事象について理解できる ・有害事象出現時に報告できる
投薬								
注射				 				
処置			   	  				
指導								
医師	指示	  体重は、入院中に着ている服装に着替えてから測定します	  アセトアミノフェン2錠 レスタミン3錠	  体重は、入院中に着ている服装に着替えてから測定します	  体重は、入院中に着ている服装に着替えてから測定します	  体重は、入院中に着ている服装に着替えてから測定します	  体重は、入院中に着ている服装に着替えてから測定します	  体重は、入院中に着ている服装に着替えてから測定します
	対症指示		リツキシマブ投与当日の発熱は  歩行（棟内）	「計測：体重」 				
検査	検体検査 生理検査 放射線 その他							
輸血 手術								
看護	清潔	 入浴する時間によっては自宅で済ませてきていただいた方が良いでしょう。	 また全身清拭を希望される方にはタオルをお渡しします。うがい手洗いをきちんと行い清潔に心がけましょう。					
	日常生活ケア	 治療後便秘になりやすいので治療前に排便があるといいです。便秘になりやすい方にはお薬で調節します。	 治療後便秘になりやすいので治療前に排便があるといいです。便秘になりやすい方にはお薬で調節します。	 治療後便秘になりやすいので治療前に排便があるといいです。便秘になりやすい方にはお薬で調節します。	 治療後便秘になりやすいので治療前に排便があるといいです。便秘になりやすい方にはお薬で調節します。	 治療後便秘になりやすいので治療前に排便があるといいです。便秘になりやすい方にはお薬で調節します。	 治療後便秘になりやすいので治療前に排便があるといいです。便秘になりやすい方にはお薬で調節します。	 治療後便秘になりやすいので治療前に排便があるといいです。便秘になりやすい方にはお薬で調節します。
	排泄		 点滴中はなるべくお部屋で安静でお過ごしください。トイレなど移動時、点滴が漏れる危険があるので点滴を一時停止するのでナースコールでお知らせください。点滴中の下膳は看護師でおこないます。	 点滴中はなるべくお部屋で安静でお過ごしください。トイレなど移動時、点滴が漏れる危険があるので点滴を一時停止するのでナースコールでお知らせください。点滴中の下膳は看護師でおこないます。				
	その他							
	指導・教育	 医師から説明があります。看護師からも治療時の注意などの説明があります。薬剤師から薬の説明があります。	 医師から説明があります。看護師からも治療時の注意などの説明があります。薬剤師から薬の説明があります。	 医師から説明があります。看護師からも治療時の注意などの説明があります。薬剤師から薬の説明があります。	 医師から説明があります。看護師からも治療時の注意などの説明があります。薬剤師から薬の説明があります。	 医師から説明があります。看護師からも治療時の注意などの説明があります。薬剤師から薬の説明があります。	 医師から説明があります。看護師からも治療時の注意などの説明があります。薬剤師から薬の説明があります。	 医師から説明があります。看護師からも治療時の注意などの説明があります。薬剤師から薬の説明があります。
								

R-CHOP療法<初回導入用 21日間> (HEM005)

ステップ名称		入院8日目	入院9日目	入院10日目	入院11日目	入院12日目	入院13日目	入院14日目	
		8日目	9日目	10日目	11日目	12日目	13日目	14日目	
		day7	day8	day9	day10	day11	day12	day13	
患者状態									
知識・教育・理解		■治療について理解できる ・合併症の予防方法を言える	■日常生活の注意点について理解できる ・感染予防の必要性を言える	■日常生活の注意点について理解できる ・感染予防の必要性を言える	■日常生活の注意点について理解できる ・感染予防の必要性を言える	■日常生活の注意点について理解できる ・感染予防の必要性を言える	■日常生活の注意点について理解できる ・感染予防の必要性を言える	■日常生活の注意点について理解できる ・感染予防の必要性を言える	
投薬									
注射									
医師	処置								
	指導								
	指示	 【バイタルサイン-4検】  7時に体重測定します 体重は、入院中に着ている服装に着替えてから測定します	 【バイタルサイン-4検】  7時に体重測定します 体重は、入院中に着ている服装に着替えてから測定します	 【バイタルサイン-4検】  7時に体重測定します 体重は、入院中に着ている服装に着替えてから測定します	 【バイタルサイン-4検】  7時に体重測定します 体重は、入院中に着ている服装に着替えてから測定します	 【バイタルサイン-4検】  7時に体重測定します 体重は、入院中に着ている服装に着替えてから測定します	 【バイタルサイン-4検】  7時に体重測定します 体重は、入院中に着ている服装に着替えてから測定します	 【バイタルサイン-4検】  7時に体重測定します 体重は、入院中に着ている服装に着替えてから測定します	
対症指示									
検査	検体検査								
	生理検査								
	放射線								
	その他								
輸血									
手術									
看護	日常生活ケア	清潔	 状況に応じて清拭 入浴 シャワー一浴になります	 状況に応じて清拭 入浴 シャワー一浴になります	 状況に応じて清拭 入浴 シャワー一浴になります	 状況に応じて清拭 入浴 シャワー一浴になります	 状況に応じて清拭 入浴 シャワー一浴になります	 状況に応じて清拭 入浴 シャワー一浴になります	 状況に応じて清拭 入浴 シャワー一浴になります
		排泄	 自分の排泄習慣を知っておきましょう。治療後便秘になりやすいので治療前に排便があるといいです。便秘になりやすい方にはお薬で調節します。	 自分の排泄習慣を知っておきましょう。治療後便秘になりやすいので治療前に排便があるといいです。便秘になりやすい方にはお薬で調節します。	 自分の排泄習慣を知っておきましょう。治療後便秘になりやすいので治療前に排便があるといいです。便秘になりやすい方にはお薬で調節します。	 自分の排泄習慣を知っておきましょう。治療後便秘になりやすいので治療前に排便があるといいです。便秘になりやすい方にはお薬で調節します。	 自分の排泄習慣を知っておきましょう。治療後便秘になりやすいので治療前に排便があるといいです。便秘になりやすい方にはお薬で調節します。	 自分の排泄習慣を知っておきましょう。治療後便秘になりやすいので治療前に排便があるといいです。便秘になりやすい方にはお薬で調節します。	 自分の排泄習慣を知っておきましょう。治療後便秘になりやすいので治療前に排便があるといいです。便秘になりやすい方にはお薬で調節します。
	その他								
	指導・教育	 クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。医師から説明があります。看護師からも治療時の注意などの説明があります。薬剤師から薬の説明があります。	 クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。医師から説明があります。看護師からも治療時の注意などの説明があります。薬剤師から薬の説明があります。	 クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。医師から説明があります。看護師からも治療時の注意などの説明があります。薬剤師から薬の説明があります。	 クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。医師から説明があります。看護師からも治療時の注意などの説明があります。薬剤師から薬の説明があります。	 クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。医師から説明があります。看護師からも治療時の注意などの説明があります。薬剤師から薬の説明があります。	 クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。医師から説明があります。看護師からも治療時の注意などの説明があります。薬剤師から薬の説明があります。	 クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。医師から説明があります。看護師からも治療時の注意などの説明があります。薬剤師から薬の説明があります。	 クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。医師から説明があります。看護師からも治療時の注意などの説明があります。薬剤師から薬の説明があります。

R-CHOP療法<初回導入用 21日間> (HEM005)

ステップ名称			入院15日目	入院16日目	入院17日目	入院18日目	入院19日目	入院20日目	入院21日目
			15日目	16日目	17日目	18日目	19日目	20日目	21日目
			day14	day15	day16	day17	day18	day19	day20
患者状態									
知識・教育・理解			■日常生活の注意点について理解できる ・感染予防の必要性を言える	■日常生活の注意点について理解できる ・感染予防の必要性を言える	■日常生活の注意点について理解できる ・感染予防の必要性を言える	■日常生活の注意点について理解できる ・感染予防の必要性を言える	■日常生活の注意点について理解できる ・感染予防の必要性を言える	■日常生活の注意点について理解できる ・感染予防の必要性を言える	■治療について理解できる ・合併症の予防方法を言える ・退院指導内容を言える
									■日常生活の注意点について理解できる ・退院後の生活に対する不安の訴えがない ・感染予防の必要性を言える
投薬									
注射									
医師	処置								
	指導								
	指示		【バイタルサイン-4検】 ⇒ 7時に体重測定します 体重は、入院中に着ている服装に着替えてから測定します						
	対症指示								
検査	検体検査								
	生理検査								
	放射線								
	その他								
輸血									
手術									
看護	日常生活ケア	清潔	⇒ 状況に応じて清拭 入浴 シャワー一浴になります						
		排泄	⇒ 自分の排泄習慣を知っておきましょう。治療後便秘になりやすいので治療前に排便があるといいです。便秘になりやすい方にはお薬で調節します。						
	その他								
	指導・教育	⇒ クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。医師から説明があります。看護師からも治療時の注意などの説明があります。薬剤師から薬の説明があります。	⇒ クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。医師から説明があります。看護師からも治療時の注意などの説明があります。薬剤師から薬の説明があります。 パス説明						

