リツキサン点滴　初回導入用　（KID003）

ステップ名称			入院日	２日目
			1日前	基準日
			化学療法前日	リツキサン　（day1）
知識・教育・理解			■治療について理解できる ・治療に対する不安の訴えがない ・説明内容に疑問の表出がない	■治療について理解できる ・化学療法中のチューブ類・ポンプの取り扱いを言える
				■有害事象について理解できる ・有害事象出現時に報告できる
投薬				リツキサン投与３０分前に内服しましょう〈コカール２錠、レスタミン３錠」
注射				医師により点滴を始めます。
医師	処置		Sp02測定	Sp02測定
				心電図モニター
	指導			
	指示		安静度	トイレには、点滴スタンドを持っての移動になります。 移動中ポンプを一時的に止めますのでコールで看護師を呼んでください
			血圧測定	
			検温	リツキサン投与時体温測定
			身長測定	リツキサン投与時血圧測定
			主治医に確認してから内服していただきます。 抗凝固剤を飲んでいた方は休薬の確認をします。 再開指示あるまで内服せずにお願いします。	
			体重測定	体重測定
	対症指示			
検査	検体検査			
	生理検査			
	放射線			
	その他			
輸血				
手術				
看護	日常生活ケア	清潔	入浴は15時までです。 入院する時間によっては自宅で済ませてきていただいた方がよい場合もあります。	点滴前にシャワー浴ができます。 また全身清拭を希望される方にはタオルをお渡しします。
		排泄	自分の排泄習慣を知っておきましょう	トイレには、点滴スタンドを持っての移動になります。 移動中ポンプを一時的に止めますのでコールで看護師を呼んでください
		その他		
	指導・教育		パス説明	パス説明
	観察		治療の理解を確認します	治療の理解を確認します
				悪寒戦慄 悪心 倦怠感 呼吸困難 食欲 頭痛 掻痒感 不定形発疹 発赤〔刺入部周囲 腫脹〔ライン刺入部〕
	その他			
食事			腎臓食となります。	腎臓食となります。
栄養指導				
リハビリ				
文書			入院診療計画書	退院療養計画書
カルテ	医師			
	看護師			
	コメディカル			
コメント				
指導料・加算				