


# リツキサン点滴 2回目以降 (KID004)

ステップ名称		入院日	2日目
		1日前	基準日
		化学療法前日	リツキサン (day2)
知識・教育・理解		<ul style="list-style-type: none"> <li>■治療について理解できる</li> <li>・治療に対する不安の訴えがない</li> <li>・説明内容に疑問の表出がない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■治療について理解できる</li> <li>・化学療法中のチューブ類・ポンプの取り扱いを言える</li> <li>■有害事象について理解できる</li> <li>・有害事象出現時に報告できる</li> </ul>
投薬			 リツキサン投与30分前に内服しましょう (コカール2錠、レスタミン3錠)
注射			 入院点滴
医師	処置	 SpO2測定	 SpO2測定
			 心電図モニター
	指導	 安静度	 安静度
		 血圧測定	 血圧測定
		 検温	 検温
		 体重測定	 体重測定
		 身長測定	 リツキサン投与時血圧測定
		 主治医に確認してから内服していただきます。抗凝固剤を飲んでいた方は休薬の確認をします。再開指示あるまで内服せずをお願いします。	 リツキサン投与时体温測定
			 リツキサン
	対症指示		
検査	検体検査		
	生理検査		
	放射線		
	その他		
	輸血		
看護	日常生活ケア	 入浴は15時までです。入院する時間によっては自宅で済ませてきていただいた方が良いでしょう	 点滴前にシャワー浴ができます。また全身清拭を希望される方にはタオルをお渡しします。
		 自分排泄習慣を知っておきましょう	 トイレには、点滴スタンドを持つての移動になります。移動中ポンプを一時的に止めますのでコールで看護師を呼んでください
		その他	
	指導・教育	 バス説明 医師から説明があります。看護師からも治療時の注意などの説明があります。薬剤師から薬の説明があります。	 バス説明
		 治療の理解を確認します	 治療の理解を確認します
	観察		 悪寒戦慄 悪心 倦怠感 呼吸困難 食欲 頭痛 掻痒感 不定形発疹 発赤【刺入部周囲 腫脹【ライン刺入部】
		その他	
食事		 腎臓食となります	 腎臓食となります
栄養指導			
リハビリ			
文書		 入院療養計画書 化学療法治療承諾書 確認	 退院療養計画書
カルテ	医師		
	看護師		
	コメディカル		
コメント			
指導料・加算			