ステップ名称			手術3日前	手術2日前	手術1日前		手術		手術後1日目
			3日前	2日前	1日前		基準日		1日後
					■身体的準備ができている ・体温【適正値:≦37.5℃】 ・抗血小板剤・抗凝固剤が予定通り中止 されている ・禁煙ができている	手術前 ■合併症の症状・所見がない ・出血がない ・深部静脈血栓の症状がない	手術中	手術後	■合併症の症状・所見がない ・出血がない ・深部静脈血栓の症状がない
含者状態						■バイタルサインが安定している ・呼吸数【適正値:12~30回/分】 ・収縮期血圧【適正値:≧80mmHg】 ・心拍数【適正値:50~120回/分】 ■感染の徴候がない ・体温【適正値:≦37.5℃】			■バイタルサインが安定している ・呼吸数【適正値:12~30回/分】 ・収縮期血圧【適正値:≧80mmHg】 ・心拍数【適正値:50~120回/分】 ■感染の徴候がない ・体温【適正値:≦37.5℃】
						■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和することが	べできる		■創部に問題がない ・創周囲に熱感がない ・創部の発赤がない
					■リハビリについて理解できる ・運動ができる ・リハビリの内容を知っている ・運動の必要性を言える ・許可されている可動域を知っている				■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和すること できる
ロ識・教育・理 军					■手術について理解できる ・オリエンテーション内容を言える ・手術・麻酔に対する不安の訴えがない ・説明内容に疑問・不信感の表出がない ・入院経過を言える				
生活動作・日常 動作・リハビリ					■装具の着脱ができる ・装具着脱を実施できる				
								痛み止めを処方します。	
主射					生食ロック	術前から点滴があります。		術後に点滴があります。	点滴があります。
	処置				⇒ 浣腸の処置があります 手術で使用する点滴のルートを確 保します			心電図モニター 指に酸素濃度モニターをつけます	心電図モニター おに酸素濃度モニターをつけま
					,,			マスクから酸素を投与します。	ガーゼの交換を行います 尿道バルンを除去します。
	指導								
			ニーブレースの採寸		1日2回、血圧などの測定があります。	手術前に血圧などの測定がありま		ニーブレースの装着	1日4回、血圧などの測定があ ます。
			装具の確認 外出外泊許可	⇒ 装具の確認 外出外泊許可	参 装具の確認 外出外泊許可	弾性ストッキングを着用していた だきます。		弾性ストッキングを着用していた だきます。	
医師			PCLリハビリ	⇒ PCLリハビリ	→ PCLリハビリ	→ PCLリハビリ	→ PCLリハビリ	⇒ PCLリハビリ	→ PCLリハビリ
	별구		入院時指示	→ 入院時指示	→ 入院時指示	→ 入院時指示	→ 入院時指示	→ 入院時指示	→ 入院時指示
	指示				夕食以降絶食になります。水分は 飲んでいただいて構いません。 中止薬以外の常用薬は夕方まで内 服していただきます。			術後はこまめに血圧などの測定があります。 手術後よりフットポンプ使用します	7
	対症指示				症状に応じて薬を使用します。何 かございましたらお声かけください。				ニーブレースの装着
	₩/+ ₩ *								∕ 血液検査があります。
	検体検査 生理検査								
検査	放射線						帰室前Xp		
	その他						(6)		
输血 手術							○● 手術を行います		
J- 1415		清潔			シャワー浴があります。	手術前にシャワー浴があります。	a c		全身清拭をします。
看護	日常生活ケア	排泄			▶ トイレを使用できます。		▶ 尿道バルンが入っています。		▶ トイレを使用できます。
		その他			(* *		()		()

テップ名称		方(ORT114R) _{手術3日前}	手術2日前	手術1日前		手術		手術後1日目
		3日前	2日前	1日前		基準日		1日後
					手術前	手術中	手術後	
	指導・教育			手術時間につき説明します。	指輪・コンタクトレンズ・義歯などをはずします。		肺塞栓予防につき説明します。	肺塞栓予防につき説明します。
				禁煙につき指導します。	ご家族に手術室・家族相談室を案内します。		手術後、医師よりご家族に説明があります。	クリニカルパス(入院生活の) について説明します。
				クリニカルパス(入院生活の流れ)について説明します。				
				弾性ストッキングのサイズを測定 します。				
				適宜創部を観察します	適宜創部を観察します		適宜創部を観察します	適宜創部を観察します
				適宜創部を観察します	適宜創部を観察します		適宜創部を観察します	適宜創部を観察します
				適宜創部を観察します	適宜創部を観察します		適宜創部を観察します	適宜創部を観察します
					適宜創部を観察します			適宜創部を観察します
				適宜創部を観察します	適宜創部を観察します		適宜創部を観察します	適宜創部を観察します
				適宜創部を観察します	適宜創部を観察します		適宜創部を観察します	⇒ 適宜創部を観察します
				適宜創部を観察します	適宜創部を観察します		適宜創部を観察します	⇒ 適宜創部を観察します
	観察			適宜創部を観察します	適宜創部を観察します		適宜創部を観察します	⇒ 適宜創部を観察します
				適宜創部を観察します	適宜創部を観察します		適宜創部の観察をします	⇒ 適宜創部の観察をします
				適宜創部を観察します	適宜創部を観察します		適宜創部を観察します	⇒ 適宜創部を観察します
				適宜創部の観察をします			適宜創部を観察します	⇒ 適宜創部を観察します
							適宜創部を観察します	適宜創部を観察します
							適宜創部を確認します	⇒ 適宜創部を確認します
				原 爪切りを行います。	手術着に着替えていただきます。		うがいができます。	寝衣を交換します。
	その他			マニキュアを除去します。			積極的に深呼吸していただきます。	歩行を介助します。
	- 7 07 個			常用薬を確認します。			積極的に下肢の運動をしていただきます。	離床できれば弾性ストッキング 不要です。
							ベッドの頭側を高くします。	
i				タまで食事があります。夕食以降 は絶食です。	絶食です。	 	絶食	朝食より食事が始まります
修指導バビリ		<i>ス</i> リハビリ						
· · · ·		冷 入院診療計画書						
	医師							
レテ	医師 看護師							
メント	コメディカル							
算料・加算								

ひにくり フーチ/J 円 ステップ名称		位 (URITI4K) 手術後2日目	手術後3日目	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後
		2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後
		■感染の徴候がない ・体温【適正値:≦37.5°C】	■感染の徴候がない ・体温【適正値:≦37.5°C】	■感染の徴候がない・体温【適正値:≦37.5℃】	■感染の徴候がない ・体温【適正値:≦37.5°C】	■感染の徴候がない・体温【適正値:≦37.5°C】	■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和することが できる	■疼痛のコントロールができている ・ 鎮痛処置により疼痛を緩和すること できる
		■創部に問題がない ・創周囲に熱感がない ・創部の発赤がない	■創部に問題がない ・ 創用囲に熱感がない ・ 創部の発赤がない	■創部に問題がない ・創周囲に熱感がない ・創部の発赤がない	■ 創部に問題がない	■創部に問題がない ・ 創周囲に熱感がない ・ 創部の発赤がない		
者状態		■疼痛のコントロールができている ・鎖痛処置により疼痛を緩和するこ できる	■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和する。 できる	■疼痛のコントロールができている ・・鎮痛処置により疼痛を緩和するこ できる	■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和すること できる	■疼痛のコントロールができている ・が・鎮痛処置により疼痛を緩和することだ できる	,¢	
口識・教育・理 K							■リハビリについて理解できる ・運動ができる ・リハビリの内容を知っている ・運動の必要性を言える ・許可されている可動域を知っている	■リハビリについて理解できる ・運動ができる ・リハビリの内容を知っている ・運動の必要性を言える ・許可されている可動域を知っている
活動作・日常 作・リハビリ		■車椅子乗車ができる ・介助で車椅子移乗ができる ・自立で車椅子移乗ができる	■車椅子乗車ができる ・介助で車椅子移乗ができる ・自立で車椅子移乗ができる	■車椅子乗車ができる ・介助で車椅子移乗ができる ・自立で車椅子移乗ができる	■車椅子乗車ができる ・介助で車椅子移乗ができる ・自立で車椅子移乗ができる	■車椅子乗車ができる ・介助で車椅子移乗ができる ・自立で車椅子移乗ができる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助でできる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助でできる
· 薬								
処置								
指導								
1H (7		1日2回、血圧などの測定があ	りま 💠 1日2回、血圧などの測定があ す。	5りま 1日1回、血圧などの測定があ す。	りま 💠 1日1回、血圧などの測定があり	ま 1日1回、血圧などの測定があります。	:	: 1日1回、血圧などの測定がありす。
		弾性ストッキングを着用していたきます。						
師		PCLリハビリ	PCLリハビリ	⇒ PCLリハビリ	PCLリハビリ	⇒ PCLリハビリ	⇒ PCLリハビリ	⇒ PCLリハビリ
指示		→ 入院時指示	→ 入院時指示	→ 入院時指示	→ 入院時指示	→ 入院時指示	→ 入院時指示	→ 入院時指示
		ニーブレースの装着	ニーブレースの装着	ニーブレースの装着	ニーブレースの装着	ニーブレースの装着	ニーブレースの装着	
対症指示								
							血液検査があります。	
生理検査								
放射線		術後CT						
その他								
術								
		全身清拭をします。	全身清拭をします。	全身清拭をします。	全身清拭をします。	全身清拭をします。	全身清拭をします。	全身清拭をします。
護 日常生活ケア	清潔			創部がぬれないようにシャワ- が可能となります。	一浴 創部がぬれないようにシャワー が可能となります。	浴 創部がぬれないようにシャワー浴が可能となります。	創部がぬれないようにシャワー浴が可能となります。	創部がぬれないようにシャワーが可能となります。
	排泄	トイレを使用できます。	トイレを使用できます。	トイレを使用できます。	トイレを使用できます。			
	その他							

	十字靭帯)再建術		T#W000	A 17/4	FD.#	0.7%		0.77
ステップ名称		手術後2日目	手術後3日目	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後
		2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後
		クリニカルパス(入院生活の流れ)について説明します。	(注) について説明します。					
			関節を動かす器械を装着します。 2時間です。	⇒ 関節を動かす器械を装着します 2時間です。				
	指導・教育			viii () 0				
		⇨ 適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します
		19日間中で観示しより	地丘島中で既宗しより	迎且剧印を既奈しより	迎且剧中で既宗しより	迎且創印を既奈しより	適宜創部を観察します	1 地丘周叩を観示しより
		⇒ 適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	■ 適宜創部を観察します	⇒ 適宜創部を観察します	⇒ 適宜創部を観察します
		適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	☆ 適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	☆ 適宜創部を観察します	適宜創部を観察します
		適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	⇒ 適宜創部を観察します	適宜創部を観察します
		⇒ 適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	☆ 適宜創部を観察します	☆ 適宜創部を観察します	⇒ 適宜創部を観察します	
		適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	☆ 適宜創部を観察します	
		適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	
=#	年日 がマ	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	
護	観察	☆ 適宜創部の観察をします	⇒ 適宜創部の観察をします					
		適宜創部を観察します						
		⇒ 適宜創部を観察します						
		☆ 適宜創部を観察します	適宜創部を観察します					
		⇒ 適宜創部を確認します	☆ 適宜創部を確認します					
		適宜創部を観察します	⇒ 適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	⇒ 適宜創部を観察します	適宜創部を観察します
		適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	☆ 適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	☆ 適宜創部を観察します	☆ 適宜創部を観察します	適宜創部を観察します
		適宜創部を観察します	⇒ 適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	■ 適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します
	その他							
		食事	食事	食事	食事	食事	食事	食事
き 要指導		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>			<u> </u>
ヽビリ								
書								
	医師							
ルテ	看護師 コメディカル							
メント 領料・加算								

ステップ名称			9日後	10日後	術後11日	12日後	13日後	14日後	15日後
			9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後
			■疼痛のコントロールができている	■疼痛のコントロールができている	■疼痛のコントロールができている	■疼痛のコントロールができている	■疼痛のコントロールができている	■疼痛のコントロールができている	■関節の可動域が改善する
			・鎮痛処置により疼痛を緩和することできる	- が ・ 鎮痛処置により疼痛を緩和するこ できる	とが・鎮痛処置により疼痛を緩和することができる	・鎮痛処置により疼痛を緩和することが できる	・鎮痛処置により疼痛を緩和することができる	- 負痛処置により疼痛を緩和することができる	・可動域に問題がない
者状態									
			■リハビリについて理解できる	■リハビリについて理解できる	■リハビリについて理解できる	■リハビリについて理解できる	■リハビリについて理解できる	■リハビリについて理解できる	■日常生活の注意点について理解でき
識・教育・理			運動ができる・リハビリの内容を知っている運動の必要性を言える・許可されている可動域を知っている	・運動ができる・リハビリの内容を知っている・運動の必要性を言える・許可されている可動域を知ってい	・運動ができる・リハビリの内容を知っている・運動の必要性を言える	・運動ができる ・リハビリの内容を知っている ・運動の必要性を言える ・許可されている可動域を知っている	・運動ができる ・リハビリの内容を知っている ・運動の必要性を言える ・許可されている可動域を知っている	・運動ができる ・リハビリの内容を知っている ・運動の必要性を言える ・許可されている可動域を知っている	・退院後の生活に対する不安の訴えがない ・退院後の日常生活のわからないことる 聞くことができる
三活動作・日常			■歩行ができる	■歩行ができる	■歩行ができる	■歩行ができる	■歩行ができる	■歩行ができる	■歩行ができる
が作・リハビリ			・器具・装具・他者の援助でできる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助でできる	・器具・装具・他者の援助でできる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助でできる	・器具・装具・他者の援助でできる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助でできる	・安定した歩行ができる
殳薬									
E射									
				回診にて抜糸します					
処抗	置								
指達	· 道								
			→ 1日1回、血圧などの測定があり す。	ま 1日1回、血圧などの測定があす。	りま 🔷 1日1回、血圧などの測定がありま す。	計員は 1日1回、血圧などの測定があります。	:	→ 1日1回、血圧などの測定があります。	⇒ 1日1回、血圧などの測定があります。
			, ,			, ,	, ,	, ,	
E 師			⇒ PCLリハビリ	→ PCLリハビリ	→ PCLリハビリ	⇒ PCLリハビリ	→ PCLリハビリ	⇒ PCLリハビリ	⇒ PCLリハビリ
15.	_		→ 入院時指示	→ 入院時指示	→ 入院時指示	→ 入院時指示	→ 入院時指示	→ 入院時指示	→ 入院時指示
指	不					,	·		
対判	症指示								
	体検査								
(1)	理検査								
	射線 の他								
育血									
			⇒ 全身清拭をします。	全身清拭をします。	全身清拭をします。	全身清拭をします。	→ 全身清拭をします。	⇒ 全身清拭をします。	全身清拭をします。
f護 日1	常生活ケア	清潔	創部がぬれないようにシャワー が可能となります。	浴 創部がぬれないようにシャワー が可能となります。	一浴 創部がぬれないようにシャワー浴が可能となります。	創部がぬれないようにシャワー浴が可能となります。	創部がぬれないようにシャワー浴が可能となります。	創部がぬれないようにシャワー浴が可能となります。	創部がぬれないようにシャワー浴が可能となります。
		排泄							
		その他							

						引角建術 石		
14日後 15日後	13日後	12日後	術後11日	1 0 日後	9日後		称	ステップ名称
14日後 15日後	13日後	12日後	11日後	10日後	9日後			
■ 関節を動かす器械を装着します。 2時間です。 関節を動かす器械を装着します。 2時間です。	関節を動かす器械を装着します。 2時間です。	⇒ 関節を動かす器械を装着します。 2時間です。	■ 関節を動かす器械を装着します。 2時間です。	⇒ 関節を動かす器械を装着します。 2時間です。	関節を動かす器械を装着します。 2時間です。	•	指導・教育	
		☆ 適宜創部を観察します	🖒 適宜創部を観察します		適宜創部を観察します			
適宜創部を観察します適宜創部を観察します適宜創部を観察します			<u> </u>	適宜創部を観察します 適宜創部を観察します				
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	地 且 創 印 で 戦 余 し ま り	迎旦剧叩を戦宗しまり					
				適宜創部を観察します		4		
				適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	₽		
							観察	镬
⇒ 適宜創部を観察します ⇒ 適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	■ 適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します ■	➡		
⇒ 適宜創部を観察します ⇒ 適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	■ 適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します ■	€		
適宜創部を観察します 適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	☆ 適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	•		
							その他	
食事	食事	食事	食事	食事	食事			事
								養指導
								ハビリ
								書
							医師 看護師	ルテ
						ı	コメディカル	,
								コメント 指導料・加算

ステップ名称			16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後
			16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後
			■関節の可動域が改善する ・可動域に問題がない	■関節の可動域が改善する ・可動域に問題がない	■関節の可動域が改善する ・可動域に問題がない	■関節の可動域が改善する ・可動域に問題がない	■関節の可動域が改善する ・可動域に問題がない	■関節の可動域が改善する ・可動域に問題がない
								
識・教育・理			■日常生活の注意点について理解できる・退院後の生活に対する不安の訴えがない・退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる	()	5 ■日常生活の注意点について理解できる・退院後の生活に対する不安の訴えがない・退院後の日常生活のわからないことを 聞くことができる	()	(L)	(I)
識・教育・理								
三活動作・日常 加作・リハビリ	1		■歩行ができる・安定した歩行ができる	■歩行ができる・安定した歩行ができる	■歩行ができる ・安定した歩行ができる	■歩行ができる ・安定した歩行ができる	■歩行ができる・安定した歩行ができる	■歩行ができる ・安定した歩行ができる
 ː薬								
 射								
	処置							
	指導			→ 1日1回、血圧などの測定があります。		→ 1日1回、血圧などの測定があります。	→ 1日1回、血圧などの測定があります。	→ 1日1回、血圧などの測定が す。
師			PCLリハビリ	→ PCLリハビリ	→ PCLリハビリ	⇒ PCLリハビリ	→ PCLリハビリ	→ PCLリハビリ
	指示		→ 入院時指示	→ 入院時指示	入院時指示	→ 入院時指示	→ 入院時指示	→ 入院時指示
	対症指示							
	検体検査							
査	生理検査							
	放射線							
ф	その他							
術			全身清拭をします。	全身清拭をします。	全身清拭をします。	全身清拭をします。	全身清拭をします。	全身清拭をします。
		清潔	創部がぬれないようにシャワー浴			創部がぬれないようにシャワー浴	♪ 創部がぬれないようにシャワー浴	■ 創部がぬれないようにシャ
看護	日常生活ケア	排泄	が可能となります。	が可能となります。	が可能となります。	が可能となります。	が可能となります。	が可能となります。
		1 130 444	1		· ·	·		

テップ名称		16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後
		16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後
	指導・教育	製節を動かす器械を装着します。 2時間です。	⇒ 関節を動かす器械を装着します。 2時間です。	⇒ 関節を動かす器械を装着します。 2時間です。	製節を動かす器械を装着します。 2時間です。	→ 関節を動かす器械を装着します。 2時間です。	➡ 関節を動かす器械を装着しま 2時間です。
		☆ 適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	■ 適宜創部を観察します
蒦	観察						
		☆ 適宜創部を観察します	☆ 適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	■ 適宜創部を観察します	⇒ 適宜創部を観察します	🖒 適宜創部を観察します
		適宜創部を観察します	■ 適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	The state of the s		⇒ 適宜創部を観察します
		適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	適宜創部を観察します	⇒ 適宜創部を観察します
	その他						
‡		食事	食事	食事	食事	食事	食事
Ě 指導							
バビリ							
F	GE AT						
ルテ	医師 看護師 コメディカル						
メント 導料・加算							