	投関節置	置換術	(ORT130R)				
ステップ名称			手術3日前	手術2日前 2日前	手術1日前		術
			2 H HI	2 11 811		手術前	手術中
					■身体的準備ができている ・体温【適正値:≦37.5℃】 ・抗血小板剤・抗凝固剤が予定通り中止	■合併症の症状・所見がない ・出血がない ・深部静脈血栓の症状がない	
					されている ・禁煙ができている	■感染の徴候がない	
						・体温上昇がない・創部の発赤がない	
患者状態						■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和することが	できる
					■手術について理解できる ・オリエンテーション内容を言える ・手術・麻酔に対する不安の訴えがない		
知識・教育・理					・手術・麻酔に対する不安の訴えがない ・説明内容に疑問・不信感の表出がない ・入院経過を言える		
角军					■日常生活の注意点について理解できる		
					・禁止肢位を言える ・禁忌肢位が守れている		
生活動作・日常 動作・リハビリ							
新規-大分類							
投薬							
注射						術前から点滴があります。	手術室で点滴を行います。
					浣腸の処置があります ************************************		
	処置				手術で使用する点滴のルートを確保します		
	指導						
	111-47		1日2回、血圧などの測定があります。	1日2回、血圧などの測定があります。	1日2回、血圧などの測定があります。	手術前に血圧などの測定があります。	
					夕食以降絶食になります。水分は 	弾性ストッキングを着用していた だきます。	弾性ストッキングを着用していただきます。
医師	# =				中止薬以外の常用薬は夕方まで内 服していただきます。		
	指示						
	対症指示				症状に応じて薬を使用します。何 かございましたらお声かけくださ い。		
	10.44.A.+				. ,		
₩. *	検体検査 生理検査						
検査	放射線						手術終了後に手術室でレントゲン を撮ります。
輸血	その他						
手術							手術
		清潔	シャワー浴があります。	シャワ一浴があります。	シャワー浴があります。	手術前にシャワー浴があります。	
	口带先江石艺		- 1 / 1 t t = - x + + +	□ 1/1 t # B * * * * * * * * * * * * * * * * * *	➡ . /. + ## # * * * * * * * * * * * * * * * *		➡ R'#, \$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	日常生活ケア	排泄	トイレを使用できます。	トイレを使用できます。	トイレを使用できます。		尿道バルンがはいります。
		その他					
		()			手術時間につき説明します。	指輪・コンタクトレンズ・義歯などをはずします。	
					禁煙につき指導します。	ご家族に手術室・家族相談室を案内します。	
					クリニカルパス(入院生活の流れ)について説明します。		
	指導・教育				弾性ストッキングのサイズを測定します。		
看護	14.3				膝を伸ばし踵をベッドより10c mほどあげる練習を行います		
					膝を伸ばす練習をします		
					足首や足の指の運動を指導します。		
					● 手術前にどの程度障害があるか観	■ 手術前にどの程度障害があるか観	
	観察				手術前にどの程度障害があるか観察します □ 爪切りを行います。	字が開いたこの住及呼音があるがW 察します 手術着に着替えていただきます。	
					フニキュアを除去します。		
	その他				常用薬を確認します。		
					(*)		
食事					タまで食事があります。夕食以降 は絶食です。	絶食です。	絶食
栄養指導			/7 ロハビロニー: ヽ. + ケハナナ				
リハビリ 文書			リハビリテーションを行います				
カルテ	医師 看護師						
コメント	1 は で イカル						
指導料・加算							

右人工	投関節置	置換術	(ORT130R)				
ステップ名称			手術	手術後1日目	手術後2日目	手術後3日目	術後4日
			基準日	1日後	2日後	3日後	4日後
			■合併症の症状・所見がない ・出血がない	■合併症の症状・所見がない ・出血がない。	■合併症の症状・所見がない ・深部静脈血栓の症状がない	■合併症の症状・所見がない ・深部静脈血栓の症状がない	■合併症の症状・所見がない ・深部静脈血栓の症状がない
			・深部静脈血栓の症状がない	・深部静脈血栓の症状がない	》从目19月1日(正月上〇)正一〇八万 · G · C ·	We that have the second second	NY TINH THE ANY THE WAY OF A
			■感染の徴候がない ・体温上昇がない	■感染の徴候がない ・体温上昇がない	■感染の徴候がない ・体温【適正値:≦37.5°C】	■感染の徴候がない ・体温上昇がない	■感染の徴候がない ・体温上昇がない
			・創部の発赤がない	・創部の発赤がない	・体温上昇がない ・創部の発赤がない	・創部の発赤がない	・創部の発赤がない
患者状態			■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和することが できる	■疼痛のコントロールができている・鎮痛処置により疼痛を緩和することができる	■筋力が改善する ・ADLが改善する	■筋力が改善する ・ADLが改善する	■ 筋力が改善する ・ ADL が改善する
					■食事摂取ができる ・嘔気・嘔吐がない	■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和することが	■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和すること
					・食事開始後に腹痛の訴えがない ■創部に問題がない ・創周囲に熱感がない	できる	できる
					・創部の発赤がない ■疼痛のコントロールができている		
					・NRS【適正値:0/10~2/10】 ・鎮痛処置により疼痛を緩和することが		
					できる ■リハビリについて理解できる ・運動ができる		
知識・教育・理 解							
					■疼痛コントロールについて理解できる ・疼痛時の対処ができる		
					■患肢の外転保持ができる	■車椅子乗車ができる	■車椅子乗車ができる
					・良肢位ができている	・介助で車椅子移乗ができる ・自立で車椅子移乗ができる	・介助で車椅子移乗ができる ・自立で車椅子移乗ができる
生活動作・日常 動作・リハビリ					■車椅子乗車ができる ・介助で車椅子移乗ができる ・自立で車棒子移乗ができる	■良肢位の保持ができる ・指示が守られている	■良肢位の保持ができる ・指示が守られている
					・自立で車椅子移乗ができる ■良肢位の保持ができる ・指示が守られている		
新規-大分類							
投薬			痛み止めを処方します。				
注射			術後に点滴があります。	点滴があります。	点滴があります。		
			心電図モニター	心電図モニター	ドレーンを抜去します	尿道バルンを除去します。	
	処置		指に酸素濃度モニターをつけます。	指に酸素濃度モニターをつけます。	ガーゼの交換を行います		
			マスクから酸素を投与します。				
	指導		☆ 術後パイタル	→ 術後バイタル	☆ 術後バイタル	→ 術後バイタル	☆ 術後バイタル
				·	<u> </u>	r	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
医師	指示		→ 弾性ストッキングを着用していただきます。 ★佐然とリコットポンプは思します。	だきます。	だきます。		弾性ストッキングを着用していただきます。
			手術後よりフットポンプ使用します	र	1日2回、血圧などの測定があります。	→ 1日2回、血圧などの測定があります。	1日1回、血圧などの測定があります。
				1日4回、血圧などの測定があります。			
				朝から水分が飲めます。			
				回診にて離床を行います			
	対症指示				血栓予防の薬を再開、または開始します		
	10.11.10.		血液検査があります。	血液検査があります。		血液検査があります。	
	検体検査 生理検査						
検査	放射線						
±A do	その他						
輸血 手術							
				▶ 全身清拭をします。	全身清拭をします。	全身清拭をします。	全身清拭をします。
		清潔		陰部の洗浄を行います。	☆ 陰部の洗浄を行います。	陰部の洗浄を行います。	➡ 陰部の洗浄を行います。
	日常生活ケア			▶ トイレを使用できます。	▶ トイレを使用できます。	🏓 トイレを使用できます。	
		排泄		(***)	(**************************************	□ 尿道バルンを抜きます。	
		その他				(° <u>~</u>	
			肺塞栓予防につき説明します。	肺塞栓予防につき説明します。			
			手術後、医師よりご家族に説明があります。	パス説明	→ パス説明	→ パス説明	パス説明
			シャンプス固定	シャンプス固定	シャンプス固定	シャンプス固定	シャンプス固定
	指導・教育			SLR指導	⇒ SLR指導	⇒ SLR指導	SLR指導
看護	拍導・教育			シャンプスを使用し創部を上に向 ける感じで真横をむきます			
	観察		手術後より手術部位や全身状態を 観察します	手術後より手術部位や全身状態を 観察します	手術後より手術部位や全身状態を 観察します	手術後より手術部位や全身状態を 観察します	手術後より手術部位や全身状態を 観察します
			うがいができます。	寝衣を交換します。			
		☆ 積相	積極的に深呼吸していただきます。	<u> </u>			
	その他		積極的に下肢の運動をしていただ きます。	離床できれば弾性ストッキングは 不要です。			
			ベッドの頭側を高くします。				
			44.4	昼から食事が始まります。			
食事			絶食				
			が世 長		<u> </u>		
栄養指導 リハビリ			和巴技				
	医師		和巴技				
栄養指導 リハビリ 文書	医師 看護師 コメディカル		和民				

ステップ名称		1	術後 5 日 5日後	術後6日 6日後	術後 7 日 7日後	術後8日	術後 9 日 9日後
							0 L K
			■合併症の症状・所見がない	■合併症の症状・所見がない	■合併症の症状・所見がない	■合併症の症状・所見がない	■合併症の症状・所見がない
			・深部静脈血栓の症状がない	・深部静脈血栓の症状がない	・深部静脈血栓の症状がない	・深部静脈血栓の症状がない	・深部静脈血栓の症状がない
			■感染の徴候がない ・体温上昇がない	■感染の徴候がない ・体温上昇がない	■感染の徴候がない ・体温上昇がない	■感染の徴候がない ・体温上昇がない	■感染の徴候がない ・体温上昇がない
			・創部の発赤がない	・創部の発赤がない	・創部の発赤がない	・創部の発赤がない	・創部の発赤がない
患者状態			■筋力が改善する ・ADLが改善する	■筋力が改善する ・ADLが改善する	■筋力が改善する ・ADLが改善する	■筋力が改善する ・ADLが改善する	■筋力が改善する ・ADLが改善する
			■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和すること できる	■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和することが できる	■疼痛のコントロールができている ・・鎮痛処置により疼痛を緩和することが できる	■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和することが できる	■疼痛のコントロールができている・鎮痛処置により疼痛を緩和することができる
知識・教育・理解							
生活動作・日常動作・リハビリ			■車椅子乗車ができる ・介助で車椅子移乗ができる ・自立で車椅子移乗ができる ・自立で車椅子移乗ができる ・指示が守られている	■車椅子乗車ができる ・介助で車椅子移乗ができる ・自立で車椅子移乗ができる ・自立を車椅子移乗ができる ・指示が守られている	■車椅子乗車ができる ・介助で車椅子移乗ができる ・自立で車椅子移乗ができる ・良肢位の保持ができる ・指示が守られている	■車椅子乗車ができる ・介助で車椅子移乗ができる ・自立で車椅子移乗ができる ■良肢位の保持ができる ・指示が守られている	■車椅子乗車ができる ・介助で車椅子移乗ができる ・自立で車椅子移乗ができる ■良肢位の保持ができる ・指示が守られている
新規-大分類							
投薬							
注射							
ł	処置						
	指導		-	株仏パノカリ	■ 術後バイタル	*** 術後バイタル	**************************************
	指示			→ 術後パイタルた 学 弾性ストッキングを着用していただきます。			術後パイタル
医師			1日1回、血圧などの測定がありず。	ま → 1日1回、血圧などの測定があります。	1日1回、血圧などの測定があります。	■ 1日1回、血圧などの測定がありま す。	⇒ 1日1回、血圧などの測定があります。
_							
	対症指示				/ 血液検査があります。		
4	検体検査 生理検査						
	放射線				画像検査があります		
輸血	その他						
手術			全身清拭をします。	全身清拭をします。	全身清拭をします。	全身清拭をします。	全身清拭をします。
		清潔	ENTING 067	INAME COTTO	±3/hM2 067 %	EN/HM2 067 .	EN/HIM 2 0 6 7 6
1	日常生活ケア	排泄					
		その他					
				h 0 - 11-1	シャンプスからピローへの説明し変更します		0 - 210
			・ パス説明・ シャンプス固定	→ パス説明 シャンプス固定	→ パス説明 シャンプス固定	パス説明	パス説明
			⇒ SLR指導	⇒ SLR指導	⇒ SLR指導		
看護	指導・教育			····			
	観察		⇒ 手術後より手術部位や全身状態 観察します	を 手術後より手術部位や全身状態を 観察します	・ 手術後より手術部位や全身状態を 観察します	⇒ 手術後より手術部位や全身状態を 観察します	⇒ 手術後より手術部位や全身状態を 観察します
			ixx がく ひ み り	東ルカで U ひ ツ	成分で O d- ツ	助が ひみ y	単元分で ひ ひ ソ
	その他						
食事							
栄養指導							
リハビリ 文書							
カルテ	医師 看護師						
コメント 指導料・加算	コメディカル						

	货関節 置	重換術	(ORT130R)		10-11-1	15-11	D-16
ステップ名称			術後 1 O 日 10日後	術後 1 1 日 11日後	術後12日 12日後	術後 1 3 日 13日後	術後 1 4 日 14日後
							,,,,,,
			■筋力が改善する ・ADLが改善する	■筋力が改善する・ADLが改善する	■筋力が改善する ・ADLが改善する	■筋力が改善する ・ADLが改善する	
			■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和することだ できる	■疼痛のコントロールができている・鎮痛処置により疼痛を緩和することができる	■疼痛のコントロールができている・鎮痛処置により疼痛を緩和することができる	■疼痛のコントロールができている ・鎮痛処置により疼痛を緩和することが できる	
患者状態							
知識・教育・理 解							
			■歩行ができる	■歩行ができる	■歩行ができる	■歩行ができる	■歩行ができる
			■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助でできる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助でできる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助でできる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助でできる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助でできる
生活動作・日常 動作・リハビリ			■良肢位の保持ができる ・指示が守られている	■良肢位の保持ができる ・指示が守られている	■良肢位の保持ができる ・指示が守られている	■良肢位の保持ができる ・指示が守られている	■良肢位の保持ができる ・指示が守られている
新規−大分類							■退院もしくは転院できる ・退院もしくは転院ができる
投薬							
注射							
			抜糸を行います				
	処置						
	指導					15-111 8 1 E II	15°44 % 4 km 11
			☆ 術後バイタル	→ 術後バイタル	術後バイタル	・ 術後バイタル	術後バイタル
E							
医師	指示		→ 1日1回、血圧などの測定があります。	1日1回、血圧などの測定があります。	→ 1日1回、血圧などの測定があります。	⇒ 1日1回、血圧などの測定があります。	1日1回、血圧などの測定があ す。
	THAN						
,	11.546.						
	対症指示						
	検体検査						血液検査があります。
検査	生理検査						画像検査があります
	放射線						filer
輸血							
手術			★ 全身清拭をします。	→ ◆魚海はたします	- 人名達はたします	- 全島連ばたします	-
		清潔		全身清拭をします。		全身清拭をします。	全身清拭をします。
	- 25 1 25 1		扱糸後よりシャリー冷かできます。	抜糸後よりシャワー浴ができます。	抜糸後よりシャワー浴ができます。	・ 放糸後よりンヤリー浴ができます。	抜糸後よりシャワー浴ができ 。
	日常生活ケア	排泄					
		51.72					
		その他					
			→ パス説明	→ パス説明	→ パス説明	パス説明	→ パス説明
			·			,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
看護	指導・教育						
					工作从上口子作和上口车车		
	観察		手術後より手術部位や全身状態を 観察します	手術後より手術部位や全身状態を 観察します	事術後より手術部位や全身状態を 観察します	事術後より手術部位や全身状態を 観察します	手術後より手術部位や全身状! 観察します
	その他						
	(5) 10						
食事							
栄養指導							
リハビリ						I .	
リハビリ 文書	医師						
リハビリ 文書 カルテ	医師 看護師 コメディカル						

右人工服	伇関節置	置換術 ((ORT130R)				
ステップ名称			術後15日	術後16日	術後17日	術後18日	術後19日
			15日後	16日後	17日後	18日後	19日後
ch -by 115 455							
患者状態							
knēkh WL→c TO							
知識・教育・理 解							
			■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助でできる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助でできる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助でできる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助でできる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助でできる
生活動作。 口當							
生活動作・日常 動作・リハビリ			■良肢位の保持ができる ・指示が守られている	■良肢位の保持ができる ・指示が守られている	■良肢位の保持ができる ・指示が守られている	■良肢位の保持ができる ・指示が守られている	■良肢位の保持ができる ・指示が守られている
新規-大分類			■退院もしくは転院できる ・退院もしくは転院ができる	■退院もしくは転院できる ・退院もしくは転院ができる	■ 退院もしくは転院できる ・退院もしくは転院ができる	■退院もしくは転院できる ・退院もしくは転院ができる	■退院もしくは転院できる ・退院もしくは転院ができる
投薬							
注射							
	処置						
	指導		★ 術後パイタル	術後バイタル	■ 術後バイタル	** 術後バイタル	■ 術後バイタル
			MILE, VI PID	TO BY TO YOU	MID IN THE	PO DE COLOR	NO EXTENSION
医師			1010 454 10000	- 1010 ACA KAWAKA U.T.	N 1010 ACA KAMAKAUT		N 1010 455 KAMBKALL
	指示		→ 1日1回、血圧などの測定があります。	1日1回、血圧などの測定があります。	→ 1日1回、血圧などの測定があります。	→ 1日1回、血圧などの測定があります。	→ 1日1回、血圧などの測定があります。
	対応指示						
	対症指示						
	検体検査						
検査	生理検査						
	放射線						
輸血							
手術			N	♪ ▲自津せた L ナナ	N	N	N
		清潔	全身清拭をします。	全身清拭をします。	全身清拭をします。	全身清拭をします。	全身清拭をします。
			抜糸後よりシャワー浴ができます。 ・	− 抜糸後よりシャワー浴ができます。	抜糸後よりシャワー浴ができます。	抜糸後よりシャワー浴ができます。	抜糸後よりシャワー浴ができます。
	日常生活ケア	排泄					
		196712					
		その他					
			パス説明	パス説明	■ パス説明	☆ パス説明	☆ パス説明
			(a)K)	5K)	ek)	(ak)	(ak)
看護	指導・教育						
	観察		手術後より手術部位や全身状態を 観察します	手術後より手術部位や全身状態を 観察します	手術後より手術部位や全身状態を 観察します	手術後より手術部位や全身状態を 観察します	手術後より手術部位や全身状態を 観察します
	その他						
食事							
栄養指導							
リハビリ 文書							
	医師						
	看護師 コメディカル						
コメント 指導料・加算							
		+		1	1	-	·

00 kk 0 - Ib /b-

右人工	投関節 置	置換術 ((ORT130R)			
ステップ名称			術後20日	術後21日		
			20日後	21日後		
患者状態						
知識・教育・理						
解						
			■歩行ができる	■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助でできる		
			■歩行ができる ・器具・装具・他者の援助でできる			
生活動作・日常 動作・リハビリ			■良肢位の保持ができる ・指示が守られている	■良肢位の保持ができる ・指示が守られている		
新規-大分類			■退院もしくは転院できる	■退院もしくは転院できる		
			■退院もしくは転院できる ・退院もしくは転院ができる	■退院もしくは転院できる ・退院もしくは転院ができる		
投薬						
注射						
	処置					
	北流					
	指導		⇒ 術後バイタル	→ 術後バイタル		
医師						
	45. —		→ 1日1回、血圧などの測定があります。	→ 1日1回、血圧などの測定があります。		
	指示					
	対症指示					
	2.1322.111.3					
	検体検査					
検査	生理検査			三一 不伤 <u></u>		
	放射線			画像検査があります		
輸血	その他					
手術						
			全身清拭をします。	全身清拭をします。		
		清潔		*		
			抜糸後よりシャワー浴ができます。	が不後よりンヤリー沿ができます。		
	日常生活ケア	446 2011				
		排泄				
		その他				
			→ パス説明	→ パス説明		
<i>≢</i> .≈#	指導・教育					
看護						
			★ 主体体上以手体如片以及点止性土	→ 王徐後上川王朱如片以入自业能士		
	観察		手術後より手術部位や全身状態を 観察します	⇒ 手術後より手術部位や全身状態を 観察します		
	その他					
食事						
栄養指導						
リハビリ						
文書	医師					
カルテ	看護師					
コメント	コメディカル					
指導料・加算						
				_		