

低身長(アルギニン負荷・L-DOPA負荷) (PED021)

ステップ名称		アルギニン負荷試験			L-DOPA負荷試験			
		1日目			2日目			
		検査前	検査中	検査後	検査前	検査中	検査後	
患者状態		■代謝が安定している ・低血糖症状がない			■代謝が安定している ・低血糖症状がない			
知識・教育・理解		■検査について理解できる ・検査に対する不安の訴えがない			■検査について理解できる ・検査に対する不安の訴えがない			
投薬								
注射		 アルギニンという検査のための点滴を投与します。	 アルギニンという検査のための点滴を投与します。					
医師	処置	 点滴を行います。利き手でない方に行いますので、事前に申し出てください。	 血糖測定をします。		 血糖測定をします。	 血糖測定をします。	 血糖測定をします。	
	指導							
	指示	 安静度：検査中はベッド上安静です。検査開始前と終了後は病棟内フリーとなります。  身長・体重測定をします。	 安静度：検査中はベッド上安静です。検査開始前と終了後は病棟内フリーとなります。	 安静度：検査中はベッド上安静です。検査開始前と終了後は病棟内フリーとなります。	 安静度：検査中はベッド上安静です。検査開始前と終了後は病棟内フリーとなります。	 安静度：検査中はベッド上安静です。検査開始前と終了後は病棟内フリーとなります。	 安静度：検査中はベッド上安静です。検査開始前と終了後は病棟内フリーとなります。	
	対症指示							
検査	検体検査							
	生理検査							
	放射線							
	その他							
輸血手術								
看護	日常生活ケア	清潔 排泄 その他	 トイレに行っても構いません。尿、便の回数を尿測用紙に記入してください。		 トイレに行っても構いません。尿、便の回数を尿測用紙に記入してください。			
	指導・教育		 クリニカルパスの説明をします。	 クリニカルパスの説明をします。	 クリニカルパスの説明をします。	 次回の受診日の確認をします。	 次回の受診日の確認をします。	 次回の受診日の確認をします。
	観察							
	その他		 検査薬を30分かけて投与します。点滴ルートの間から接続します。30分間はトイレに行けませんので、トイレを済ませておいてください。検査開始時から、30分後、60分後、90分後、120分後に採血をします。検査薬を入れた後、低血糖症状（冷や汗、ホースとする、手が震える）が出た場合はすぐに看護師にお知らせください。点滴は翌日の検査終了まで持続します。検査は2時間程で終了する予定です。検査中、眠ってしまうと正しい値が出ないので、眠らないように見えてあげてください。			 8時30分頃より検査を行います。内服薬をお渡しします。少量の水で飲んでください。内服後、30分後、60分後、90分後、120分後に採血をし、血圧を測ります。気分が悪くなったりしたら、すぐに看護師へお知らせください。検査中、眠ってしまうと正しい値が出ないので、眠らないように見えてあげてください。検査終了後、点滴を抜きます。入浴、運動など制限する事は何もありません。主治医の診察後、退院となります。		
食事		 検査が終了するまで絶食です。飲水は糖分を含まない水、白湯、お茶は少量は飲んでいただいて構いません。検査終了後に軽食を提供します。以後、食事制限はありません。24時以降は何も食べないでください。			 検査が終了するまで絶食です。飲水は糖分を含まない水、白湯、お茶は少量は飲んでいただいて構いません。検査終了後に軽食を提供します。以後、食事制限はありません。			
栄養指導								
リハビリ								
文書		 入院時、入院誓約書及び支払保証書、患者家族付添申請書を提出してください。						
カルテ	医師 看護師 コメディカル							
コメント								
指導料・加算								