

肺切除術（RES002）

ステップ名称			手術前1日目	手術			手術後1日目	手術後2日目	手術後3日目
			1日前	基準日			1日後	2日後	3日後
				手術前	手術中	手術後			
患者状態			■身体的準備ができている ・体温【適正值：≦37.5℃】 ・抗血小板剤・抗凝固剤が予定通り中止されている ・禁煙ができています	■麻酔から覚醒する ・開眼ができる ・意識清明である			■バイタルサインが安定している ・呼吸数【適正值：12～30回/分】 ・収縮期血圧【適正值：≧80mmHg】 ・心拍数【適正值：50～120回/分】		■呼吸状態が安定している ・酸素吸入の必要がない
				■バイタルサインが安定している ・呼吸数【適正值：12～30回/分】 ・収縮期血圧【適正值：≧80mmHg】 ・心拍数【適正值：50～120回/分】			■疼痛のコントロールができています ・NRS【適正值：0/10～2/10】		■創部に問題がない ・創周囲に熱感がない ・創部の発赤がない ・ドレーンが抜去できる
				■呼吸状態に問題がない ・SP02【適正值：≧94%】					■疼痛のコントロールができています ・NRS【適正值：0/10～2/10】
				■疼痛のコントロールができています ・NRS【適正值：0/10～2/10】					
知識・教育・理解			■手術について理解できる ・オリエンテーション内容を言える ・手術・麻酔に対する不安の訴えがない ・説明内容に疑問・不信感の表出がない ・入院経過を言える						
生活動作・日常生活動作・リハビリ							■離床ができる ・立位・歩行ができる		
新規-大分類									
投薬			 下剤を内服します			 痛み止めを処方します。	 手術後の痛み止めです。		
注射				 手術室で点滴を行います。		 術後に点滴があります。	 点滴があります。	 鎮痛剤：アセリオ点滴	 鎮痛剤：アセリオ点滴
						 術後鎮痛剤：アセリオ	 鎮痛剤：アセリオ点滴		
医師	処置					 心電図モニターを装着します。	 心電図モニターを装着します。		
						 指に酸素濃度モニターをつけます。	 指に酸素濃度モニターをつけます。	 指に酸素濃度モニターをつけます。	 指に酸素濃度モニターをつけます。
						 マスクから酸素を投与します。	 酸素を投与します。	 酸素を投与します。	 酸素を投与します。
						 胸に排液用のチューブがつきます。	 胸に排液用のチューブがつきます。	 胸に排液用のチューブがつきます。	
						 早期リハビリ加算	 早期リハビリ加算		
	指導								
	指示		 1日2回、血圧などの測定があります。	 手術前に血圧などの測定があります。	 尿道バルンが入っています。	 ベッドの頭側を高くします。	 1日4回、血圧などの測定があります。	 1日4回、血圧などの測定があります。	 1日4回、血圧などの測定があります。
			 体重測定があります。	 弾性ストッキングを着用していただきます。	 弾性ストッキングを着用していただきます。	 弾性ストッキングを着用していただきます。	 弾性ストッキングを着用していただきます。	 弾性ストッキングを着用していただきます。	 末梢ライン抜針
			 夕食以降絶食になります。水分は飲んでいただいて構いません。			 術後はこまめに血圧などの測定があります。	 朝から水分が飲めます。	 シャワー	 シャワー
			 夕食後から経口補水飲料を飲んでいただきます。	 夕食後から経口補水飲料を飲んでいただきます。		 【鎮痛剤の内服について】	 【鎮痛剤の内服について】	 【鎮痛剤の内服について】	 【鎮痛剤の内服について】
			 中止薬以外の常用薬は夕方まで内服していただきます。				 朝食前に体重測定	 朝食前に体重測定	 朝食前に体重測定
検査	検査					 尿道バルンを抜きます。			
						 尿道バルンを抜きます。			
	その他								
輸血手術						 尿道バルンを抜きます。			
看護	検査					 症状に応じて薬を使用します。何かございましたらお声かけください。	 症状に応じて薬を使用します。何かございましたらお声かけください。	 症状に応じて薬を使用します。何かございましたらお声かけください。	 症状に応じて薬を使用します。何かございましたらお声かけください。
	日常生活ケア	清潔	 入院前に自宅で入浴してきてください。	 手術前にシャワー浴があります。			 全身清拭をします。	 全身清拭をします。	 全身清拭をします。
				 手術着に着替えていただきます。			 寝衣を交換します。	 寝衣を交換します。	 寝衣を交換します。
	指導・教育	排泄その他							
			 手術時間につき説明します。	 指輪・コンタクトレンズ・義歯などはずします。		 肺塞栓予防につき説明します。	 肺塞栓予防につき説明します。		
			 禁煙につき指導します。	 ご家族に手術室・手術中待機場所への案内をします。		 手術後、医師よりご家族に説明があります。	 クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。	 クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。	 クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。
			 クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。	 クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。					
			 弾性ストッキングのサイズを測定します。						

肺切除術（RES002）

ステップ名称			手術前1日目	手術			手術後1日目	手術後2日目	手術後3日目
			1日前	基準日			1日後	2日後	3日後
				手術前	手術中	手術後			
看護	指導・教育		 術前経口補水療法につき説明します。						
			 手術後の呼吸方法、痰の出し方、寝ながらの含嗽、肺塞栓予防の下肢運動訓練の説明を行います。						
	観察								
	その他		 入院前に爪を切ってきてください。  マニキュア・ジェルネイルをしている方は入院前に落としてきてください。			 うがいができます。  積極的に深呼吸していただきます	 歩行を介助します。  離床できれば弾性ストッキングは不要です。		
食事			 夕まで食事があります。夕食以降は絶食です。	 経口補水液を指定時間まで摂取します。その後絶飲食です。	 絶食です。	 絶食です。	 朝より水分可です。昼から普通食がでます。	 普通食	 普通食
栄養指導									
リハビリ			 呼吸リハビリの依頼			 早期リハビリ	 早期リハビリ		
文書									
									
									
									
									
カルテ	医師								
	看護師								
	コメディカル								
コメント			 手術を安全に行い、術後は順調に回復していただけるよう心がけます。						
			 手術に必要な物品 ICU入室物品【バスタオル2枚、タオル1枚、ティッシュ1箱 歯ブラシ1本、歯磨き粉1個、入れ歯ケース（必要な方） 電動髭剃り（男性）、楽のみ1個、パジャマ（前開き）1着 パンツ2枚、 腹帯（マジックテープ付式）2枚、 コーチ】						
指導料・加算			DPC病名登録			早期リハビリ	早期リハビリ		

肺切除術（RES002）

ステップ名称			4日後	5日後	6日後	7日後	8-9日目	
			4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後
患者状態				■感染の徴候がない ・体温【適正值：≤38.0℃】		■感染の徴候がない ・体温【適正值：≤38.0℃】		
				■食事摂取ができる ・嘔気・嘔吐がない		■創部に問題がない ・創周囲に熱感がない ・創部の発赤がない		
				■疼痛のコントロールができている ・NRS【適正值：0/10～2/10】				
知識・教育・理解							■日常生活の注意点について理解できる ・退院後の生活に対する不安の訴えがない ・退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる	
生活動作・日常生活動作・リハビリ								
新規-大分類							■退院もしくは転院できる ・退院もしくは転院ができる	
投薬								
注射								
医師	処置							
			⇒ 指に酸素濃度モニターをつけます。 ⇒ 酸素を投与します。	⇒ 指に酸素濃度モニターをつけます。 ⇒ 酸素を投与します。	⇒ 指に酸素濃度モニターをつけます。 ⇒ 酸素を投与します。	⇒ 指に酸素濃度モニターをつけます。 ⇒ 酸素を投与します。	⇒ 指に酸素濃度モニターをつけます。 ⇒ 酸素を投与します。	⇒ 指に酸素濃度モニターをつけます。 ⇒ 酸素を投与します。
	指導							
			 1日3回、血圧などの測定があります。	⇒ 1日3回、血圧などの測定があります。	⇒ 1日3回、血圧などの測定があります。	⇒ 1日3回、血圧などの測定があります。	⇒ 1日3回、血圧などの測定があります。	⇒ 1日3回、血圧などの測定があります。
	指示		⇒ シャワー	⇒ シャワー	⇒ シャワー	⇒ シャワー	⇒ シャワー	⇒ シャワー
			⇒ 【鎮痛剤の内服について】	⇒ 【鎮痛剤の内服について】	⇒ 【鎮痛剤の内服について】	⇒ 【鎮痛剤の内服について】	⇒ 【鎮痛剤の内服について】	⇒ 【鎮痛剤の内服について】
			⇒ 朝食前に体重測定	⇒ 朝食前に体重測定	⇒ 朝食前に体重測定	⇒ 朝食前に体重測定	⇒ 朝食前に体重測定	⇒ 朝食前に体重測定
	対症指示		 症状に応じて薬を使用します。何かございましたらお声かけください。	 症状に応じて薬を使用します。何かございましたらお声かけください。	 症状に応じて薬を使用します。何かございましたらお声かけください。	 症状に応じて薬を使用します。何かございましたらお声かけください。	 症状に応じて薬を使用します。何かございましたらお声かけください。	 症状に応じて薬を使用します。何かございましたらお声かけください。
検査	検体検査					 血液検査があります。		
	生理検査							
	放射線					 胸部レントゲン写真		
	その他							
輸血手術								
看護	日常生活ケア	清潔	⇒ 全身清拭をします。  シャワー浴ができます。	⇒ 全身清拭をします。 ⇒ シャワー浴ができます。	⇒ 全身清拭をします。 ⇒ シャワー浴ができます。	⇒ 全身清拭をします。 ⇒ シャワー浴ができます。	⇒ 全身清拭をします。 ⇒ シャワー浴ができます。	⇒ 全身清拭をします。 ⇒ シャワー浴ができます。
		排泄 その他						
	指導・教育		⇒ クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。	⇒ クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。	⇒ クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。	⇒ クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。	⇒ クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。	⇒ クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。

肺切除術（RES002）

ステップ名称			4日後	5日後	6日後	7日後	8-9日目	
			4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後
看護	指導・教育							
	観察		⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒		
	その他							
食事			 普通食	 普通食	 普通食	 普通食	 普通食	 普通食
栄養指導								
リハビリ								
文書								
カルテ	医師							
	看護師							
	コメディカル							
コメント								
指導料・加算							退院時リハビリテーション指導料	退院時リハビリテーション指導料