

TAPP (SUR004)

ステップ名称		手術前1日目		手術			手術後1日目	
		1日前		基準日			1日後	
				手術前	手術中	手術後		
患者状態		<ul style="list-style-type: none"> ■身体的準備ができています ・体温【適正值：≦37.5℃】 ・抗血小板剤・抗凝固剤が予定通り中止されている ・禁煙ができています 	<ul style="list-style-type: none"> ■麻酔から覚醒する ・開眼ができる ・意識清明である 				<ul style="list-style-type: none"> ■バイタルサインが安定している ・呼吸数【適正值：12~30回/分】 ・収縮期血圧【適正值：≧80mmHg】 ・心拍数【適正值：50~120回/分】 	<ul style="list-style-type: none"> ■バイタルサインが安定している ・呼吸数【適正值：12~30回/分】 ・収縮期血圧【適正值：≧80mmHg】 ・心拍数【適正值：50~120回/分】
		<ul style="list-style-type: none"> ■バイタルサインが安定している ・収縮期血圧【適正值：≧80mmHg】 ・脈拍数【適正值：50~120回/分】 	<ul style="list-style-type: none"> ■バイタルサインが安定している ・呼吸数【適正值：12~30回/分】 ・収縮期血圧【適正值：≧80mmHg】 ・心拍数【適正值：50~120回/分】 				<ul style="list-style-type: none"> ■呼吸状態が安定している ・酸素吸入の必要がない 	
		<ul style="list-style-type: none"> ■低酸素血症の症状・所見がない ・SP02【適正值：≧94%】 	<ul style="list-style-type: none"> ■呼吸状態に問題がない ・SP02【適正值：≧94%】 				<ul style="list-style-type: none"> ■食事摂取ができる ・嘔気・嘔吐がない ・食事開始後に腹痛の訴えない 	
		<ul style="list-style-type: none"> ■意識障害の症状・所見がない ・意識レベルの低下がない 	<ul style="list-style-type: none"> ■創部に問題がない ・ガーゼの上層汚染がない 				<ul style="list-style-type: none"> ■腹部症状・所見がない ・嘔気・嘔吐がない 	
知識・教育・理解		<ul style="list-style-type: none"> ■治療について理解できる ・治療の必要性を言える 	<ul style="list-style-type: none"> ■創痛コントロールについて理解できる ・内容が表出できる ・必要性が理解できる 				<ul style="list-style-type: none"> ■日常生活の注意点について理解できる ・退院後の生活に対する不安の訴えない ・退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる 	
生活動作・日常動作・リハビリ							<ul style="list-style-type: none"> ■離床ができる ・立位・歩行ができる 	
新規-大分類							<ul style="list-style-type: none"> ■退院もしくは転院できる 	
投薬						<ul style="list-style-type: none"> ■痛み止めを処方します。 		
注射					<ul style="list-style-type: none"> ■術後に点滴があります。 			
					<ul style="list-style-type: none"> ■手術室で点滴を行います。 			
処置		<ul style="list-style-type: none"> ■患側のマーキングを行います。 	<ul style="list-style-type: none"> ■患側のマーキングを行います。 			<ul style="list-style-type: none"> ■マスクから酸素を投与します。 	<ul style="list-style-type: none"> ■マスクから酸素を投与します。 	
						<ul style="list-style-type: none"> ■心電図モニターを装着します。 	<ul style="list-style-type: none"> ■心電図モニターを装着します。 	
						<ul style="list-style-type: none"> ■指に酸素濃度モニターをつけます。 	<ul style="list-style-type: none"> ■指に酸素濃度モニターをつけます。 	
医師	指示	<ul style="list-style-type: none"> ■1日2回、血圧などの測定があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ■手術前に血圧などの測定があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ■尿道バルンが入っています。 		<ul style="list-style-type: none"> ■弾性ストッキングを着用していただきます。 	<ul style="list-style-type: none"> ■弾性ストッキングを着用していただきます。 	
		<ul style="list-style-type: none"> ■夕食以降絶食になります。水分は飲んでいただいても構いません。 	<ul style="list-style-type: none"> ■弾性ストッキングを着用していただきます。 	<ul style="list-style-type: none"> ■弾性ストッキングを着用していただきます。 		<ul style="list-style-type: none"> ■ベッドの頭側を高くします。 	<ul style="list-style-type: none"> ■1日4回、血圧などの測定があります。 	
		<ul style="list-style-type: none"> ■夕食後から経口補水飲料を飲んでいただきます。 	<ul style="list-style-type: none"> ■夕食後から経口補水飲料を飲んでいただきます。 			<ul style="list-style-type: none"> ■術後はこまめに血圧などの測定があります。 		
		<ul style="list-style-type: none"> ■中止薬以外の薬は夕方まで内服します。 				<ul style="list-style-type: none"> ■術後は酸素マスクをつけます 	<ul style="list-style-type: none"> ■術後は酸素マスクをつけます 	
	対症指示						<ul style="list-style-type: none"> ■尿道バルンを抜きます。 	
検査	検体検査						<ul style="list-style-type: none"> ■血液検査があります。 	
		生理検査						
		放射線				<ul style="list-style-type: none"> ■手術後にレントゲン検査を行います 		
		その他						
輸血								
手術				<ul style="list-style-type: none"> ■手術を行います 				
看護	日常生活ケア	清潔	<ul style="list-style-type: none"> ■入院前に自宅で入浴してきてください。 	<ul style="list-style-type: none"> ■手術前にシャワー浴があります。 			<ul style="list-style-type: none"> ■寝衣を交換します。 	
		排泄 その他		<ul style="list-style-type: none"> ■手術着に着替えていただきます。 				
	指導・教育	<ul style="list-style-type: none"> ■手術時間につき説明します。 	<ul style="list-style-type: none"> ■指輪・コンタクトレンズ・義歯などをはずします。 	<ul style="list-style-type: none"> ■肺塞栓予防につき説明します。 	<ul style="list-style-type: none"> ■肺塞栓予防につき説明します。 			
		<ul style="list-style-type: none"> ■クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。 	<ul style="list-style-type: none"> ■クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。 	<ul style="list-style-type: none"> ■手術後、医師よりご家族に説明があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ■クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ■術前経口補水療法につき説明します。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ご家族に手術室・手術中待機場所への案内をします。 						
	<ul style="list-style-type: none"> ■手術後の呼吸方法、痰の出し方、寝ながらの含嗽、肺塞栓予防の下肢運動訓練の説明を行います。 							
	<ul style="list-style-type: none"> ■禁煙指導します。 							
	<ul style="list-style-type: none"> ■弾性ストッキングのサイズを測定します。 							
	<ul style="list-style-type: none"> ■手術する側の手にマークをします。 							
	観察							
	その他	<ul style="list-style-type: none"> ■入院前に爪を切ってきてください 					<ul style="list-style-type: none"> ■離床できれば弾性ストッキングは不要です。 	
		<ul style="list-style-type: none"> ■マニキュア・ジェルネイルをしている方は入院前に落としてきてください。 					<ul style="list-style-type: none"> ■歩行を介助します。 	
食事		<ul style="list-style-type: none"> ■夕まで食事がありません。夕食以降は絶食です。 	<ul style="list-style-type: none"> ■経口補水液を指定時間まで摂取します。その後絶食です。 	<ul style="list-style-type: none"> ■絶食です。 	<ul style="list-style-type: none"> ■手術後3時間後より水分可です。 	<ul style="list-style-type: none"> ■朝から普通食が出来ます。 		
栄養指導								
リハビリ								
文書								
カルテ	医師 看護師 コメディカル							
コメント		<ul style="list-style-type: none"> ■手術を安全に行い、術後は順調に回復していただけるよう心がけます。 						
		<ul style="list-style-type: none"> ■手術に必要な物品：下着（パンツ） 						
指導料・加算								