






















































# 腹腔鏡下腎尿管全摘術 (URO022)

ステップ名称			手術前1日目		手術			手術後1日目		手術後2日目			
			1日前		基準日			1日後		2日後			
					手術前	手術中	手術後						
患者状態			<ul style="list-style-type: none"> <li>■身体的準備ができています</li> <li>・体温【適正值：<math>\leq 37.5^{\circ}\text{C}</math>】</li> <li>・抗血小板剤・抗凝固剤が予定通り中止されている</li> <li>・禁煙ができています</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■麻酔から覚醒する</li> <li>・開眼ができる</li> <li>・意識清明である</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>■バイタルサインが安定している</li> <li>・呼吸数【適正值：12~30回/分】</li> <li>・収縮期血圧【適正值：<math>\geq 80\text{mmHg}</math>】</li> <li>・心拍数【適正值：50~120回/分】</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■バイタルサインが安定している</li> <li>・呼吸数【適正值：12~30回/分】</li> <li>・収縮期血圧【適正值：<math>\geq 80\text{mmHg}</math>】</li> <li>・心拍数【適正值：50~120回/分】</li> </ul>		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>■バイタルサインが安定している</li> <li>・呼吸数【適正值：12~30回/分】</li> <li>・収縮期血圧【適正值：<math>\geq 80\text{mmHg}</math>】</li> <li>・心拍数【適正值：50~120回/分】</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>■呼吸状態に問題がない</li> <li>・SPO2【適正值：<math>\geq 94\%</math>】</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■食事摂取ができる</li> <li>・嘔気・嘔吐がない</li> </ul>		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>■呼吸状態に問題がない</li> <li>・SPO2【適正值：<math>\geq 94\%</math>】</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>■尿道不快のコントロールができています</li> <li>・カテ周囲に尿漏れがない</li> <li>・尿道痛がない</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■尿道不快のコントロールができています</li> <li>・カテ周囲に尿漏れがない</li> <li>・尿道痛がない</li> </ul>		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>■疼痛のコントロールができています</li> <li>・NRS【適正值：0/10~2/10】</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>■疼痛のコントロールができています</li> <li>・NRS【適正值：0/10~2/10】</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■疼痛のコントロールができています</li> <li>・NRS【適正值：0/10~2/10】</li> </ul>		
知識・教育・理解			<ul style="list-style-type: none"> <li>■手術について理解できる</li> <li>・オリエンテーション内容を言える</li> <li>・手術・麻酔に対する不安の訴えがない</li> <li>・説明内容に疑問・不信感の表出がない</li> <li>・入院経過を言える</li> </ul>										
生活動作・日常生活動作・リハビリ											<ul style="list-style-type: none"> <li>■離床ができる</li> <li>・立位・歩行ができる</li> </ul>		
新規-大分類													
投薬													
注射													
医師	処置												
													
	指導												
	指示												
対症指示													
													
													
													
													
検査	検体検査												
	生理検査												
	放射線												
	その他												
輸血													
手術													
看護	日常生活ケア	清潔											
		排泄											
	指導・教育												
													

# 腹腔鏡下腎尿管全摘術 (URO022)

ステップ名称		手術前1日目	手術 基準日			手術後1日目	手術後2日目	
		1日前				1日後	2日後	
			手術前	手術中	手術後			
看護	指導・教育	クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。	クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。	クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。	クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。	クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。	クリニカルパス（入院生活の流れ）について説明します。	
		弾性ストッキングのサイズを測定します。	手術着に着替えて、弾性ストッキングを履いていただきます。					
		術前経口補水療法につき説明します。						
		手術後の呼吸方法、痰の出し方、寝ながらの含嗽、肺塞栓予防の下肢運動訓練の説明を行います。						
	観察							
		その他	入院までに爪切りをしてきてください。	手術着に着替えていただきます。		寝たままうがいができます。看護師がお手伝いします。	寝衣を交換します。	
			入院までにマニキュアを除去してきてください。			積極的に深呼吸していただきます。	医師の指示に合わせて、ベッド上で少しずつ上半身を起こしていきます。看護師がお手伝いします。	
	常用薬を確認します。				積極的に下肢の運動をしていただきます。	離床できれば弾性ストッキングは不要です。		
					ベッド上安静です。ベッドで頭側30度まであげることができます。寝返りなど看護師がお手伝いさせていただきます。			
	食事	夕食より、低残渣食がです。夕食後より絶食になります。	絶食です。経口補水は手術の2時間前まで飲んでいただけます。	絶食	絶食	絶食	絶食	
栄養指導 リハビリ								
文書	入院診療計画書							
カルテ	医師 看護師 コメディカル							
コメント	主治医からの手術の説明後、説明書、承諾書に署名の上、提出をお願いします。 タバコを吸われる方は、術後の肺合併症を予防するため必ず禁煙が必要です。 足の運動は術後肺塞栓予防だけでなく筋力低下防止となります。 手術に必要なものは腹帯2枚・T字帯1枚・バスタオル1枚・薬のみまたはストロー付きのコップ	主治医許可の常用薬は内服してください		手術後は、術前におこなった呼吸練習を思いだして、排痰、深呼吸に努めましょう。	手術後は、術前におこなった呼吸練習を思いだして、排痰、深呼吸に努めましょう。 食事開始となったら、よく噛んでゆっくりと召し上がってください。（持ち込み食は控えてください） 必要に応じて点滴や治療が延長する場合があります。（主治医から説明があります）	手術後は、術前におこなった呼吸練習を思いだして、排痰、深呼吸に努めましょう。 食事開始となったら、よく噛んでゆっくりと召し上がってください。（持ち込み食は控えてください） 必要に応じて点滴や治療が延長する場合があります。（主治医から説明があります）		
指導料・加算								

# 腹腔鏡下腎尿管全摘術 (URO022)

ステップ名称			手術後3日目	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後			
			3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後			
患者状態			<ul style="list-style-type: none"> <li>■バイタルサインが安定している                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・呼吸数【適正值：12～30回/分】</li> <li>・収縮期血圧【適正值：≧80mmHg】</li> <li>・心拍数【適正值：50～120回/分】</li> </ul> </li> <li>■呼吸状態が安定している                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・酸素吸入の必要がない</li> </ul> </li> <li>■食事摂取ができる                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘔気・嘔吐がない</li> </ul> </li> <li>■尿道不快のコントロールができてい                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・カテ周囲に尿漏れがない</li> <li>・尿道痛がない</li> </ul> </li> <li>■疼痛のコントロールができてい                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・NRS【適正值：0/10～2/10】</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■バイタルサインが安定している                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・呼吸数【適正值：12～30回/分】</li> <li>・収縮期血圧【適正值：≧80mmHg】</li> <li>・心拍数【適正值：50～120回/分】</li> </ul> </li> <li>■食事摂取ができる                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘔気・嘔吐がない</li> </ul> </li> <li>■尿道不快のコントロールができてい                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・カテ周囲に尿漏れがない</li> <li>・尿道痛がない</li> </ul> </li> <li>■疼痛のコントロールができてい                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・NRS【適正值：0/10～2/10】</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■バイタルサインが安定している                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・呼吸数【適正值：12～30回/分】</li> <li>・収縮期血圧【適正值：≧80mmHg】</li> <li>・心拍数【適正值：50～120回/分】</li> </ul> </li> <li>■食事摂取ができる                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘔気・嘔吐がない</li> </ul> </li> <li>■尿道不快のコントロールができてい                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・カテ周囲に尿漏れがない</li> <li>・尿道痛がない</li> </ul> </li> <li>■疼痛のコントロールができてい                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・NRS【適正值：0/10～2/10】</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■食事摂取ができる                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘔気・嘔吐がない</li> </ul> </li> <li>■尿道不快のコントロールができてい                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・カテ周囲に尿漏れがない</li> <li>・尿道痛がない</li> </ul> </li> <li>■疼痛のコントロールができてい                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・NRS【適正值：0/10～2/10】</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■尿道不快のコントロールができてい                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・カテ周囲に尿漏れがない</li> <li>・尿道痛がない</li> </ul> </li> <li>■創部に問題がない                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・半抜糸ができる</li> <li>・創周囲に熱感がない</li> <li>・創部の発赤がない</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■創部に問題がない                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・全抜糸ができる</li> <li>・創周囲に熱感がない</li> <li>・創部の発赤がない</li> </ul> </li> </ul>			
			知識・教育・理解							<ul style="list-style-type: none"> <li>■日常生活の注意点について理解できる                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・退院後の生活に対する不安の訴えがない</li> <li>・退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる</li> </ul> </li> </ul>	
			生活動作・日常生活動作・リハビリ								
			新規-大分類								■退院もしくは転院できる
			投薬								
注射			 点滴があります。	 点滴があります。	 点滴があります。						
医師	処置						 半分のみ抜糸をします	 抜糸をします			
			 指に酸素濃度モニターをつけさせていただきます。								
	指示		 術後はこまめに血圧などの測定があります。	 術後はこまめに血圧などの測定があります。	 術後はこまめに血圧などの測定があります。	 術後はこまめに血圧などの測定があります。	 術後はこまめに血圧などの測定があります。	 術後はこまめに血圧などの測定があります。			
			 弾性ストッキングを着用していただきます。	 弾性ストッキングを着用していただきます。	 弾性ストッキングを着用していただきます。	 弾性ストッキングを着用していただきます。	 弾性ストッキングを着用していただきます。	 弾性ストッキングを着用していただきます。			
 時間尿測定します			 時間尿測定します	 時間尿測定します	 時間尿測定します	 時間尿測定します	 時間尿測定します				
対症指示		 1日4回、血圧などの測定があります。	 検温させていただきます。	 検温させていただきます。	 検温させていただきます。	 検温させていただきます。	 検温させていただきます。				
		 標準対症指示（経口可の場合）	 標準対症指示（経口可の場合）	 標準対症指示（経口可の場合）	 標準対症指示（経口可の場合）	 標準対症指示（経口可の場合）	 標準対症指示（経口可の場合）				
検査	検体検査		 朝、血液検査があります。								
	生理検査										
	放射線										
	その他										
輸血											
手術											
看護	日常生活ケア	清潔	 全身清拭をします。	 全身清拭をします。	 全身清拭をします。	 全身清拭をします。	 医師の許可後シャワー可	 医師の許可後シャワー可			
		排泄	 トイレを使用できます。				 尿道バルンを抜きます。				
	その他										
指導・教育											

