

## ＜ あなたの治療について ＞

### 外科-Pembrolizumab/PTX-乳腺-q12w

今回の治療は、Pembrolizumab/PTX療法という治療法で、キイトルーダ（KEY）とパクリタキセル（PTX）という2種類の注射薬を併用して行います。キイトルーダ、パクリタキセルは、共に腫瘍の増殖を抑えるお薬です。2つの薬を組み合わせることで、より効果を高めることができます。

## ◎ 治療全体の流れ

今回の化学療法は12週間が1コースとなっています。各コースの1日目、8日目、15日目、22日目、29日目、36日目、43日目、57日目、64日目、71日目に点滴を行います。この治療を12週間（84日間）ごとに繰り返します。副作用が強く出たり、体調がすぐれない場合は回復するまで、治療を延期したり、お薬の量を減らしたりすることがあります。

### ◎ 1ヨース分の治療スケジュール

順序	薬剤商品名 (薬の作用)	投与	43 日目	44-49 日目	50 日目	51-56 日目	57 日目	58-63 日目	64 日目	65-70 日目	71 日目	72-77 日目	78 日目	79-84 日目
①	キイトルーダ (抗がん剤) 200mg/body	点滴 約30分	点滴				点滴 お 休 み		点滴		点滴 お 休 み			
②	レスタミン (アレルギーを 抑える薬)	内服	内服				内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	
③	デキサート ファモチジン (アレルギー予防・ 吐き気止め)	点滴 約15分	点滴				点滴 お 休 み	点滴 お 休 み	点滴 お 休 み	点滴	点滴	点滴	点滴 お 休 み	
④	グラニセトロン (吐き気止め)	点滴 約30分	点滴				点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	
⑤	パクリタキセル (抗がん剤) 90mg/m <sup>2</sup>	点滴 約1時間	点滴				点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	

★ 点滴中や点滴後に、注射部位が痛い、赤くなつてはれる、水ぶくれができる、ただれるなどの症状に気づいたときは、すぐに申し出てください。また点滴中は、腕を動かすことにより針がずれ、点滴漏れが生ずることがありますので気をつけて下さい。

#### ◎起こりやすい副作用について（頻度20%以上）

キイトルーダ、パクリタキセルによる

- 白血球数減少、好中球数減少、貧血
- 恶心・嘔吐
- 関節痛・筋肉痛
- 末梢神経障害
- 脱毛

#### ◎特徴的な副作用について

キイトルーダにおける

\*免疫チェックポイント阻害剤における副作用は、別添の資料を参照して下さい。

パクリタキセルにおける

##### ●過敏反応

「呼吸困難、胸痛、低血圧、頻脈、徐脈、潮紅、血管浮腫、発汗」などの症状

##### ●刺激伝導障害

「低血圧、高血圧、徐脈」などの症状

##### ●関節痛・筋肉痛

症状は一般に、投与開始後2、3日後にあらわれ、また、早期のコース(1~3コース目)より発現する傾向にあります

##### ●発熱

症状は一般に、投与開始後6~10日後にあらわれ、また、1クール目の発現頻度が高い傾向にあります

##### ●末梢神経障害

「手足のしびれ、手足の痛み」などの症状

症状は一般に、投与開始後3~5日後にあらわれ、また、使用が長期間にわたると発現頻度が高くなる傾向にあります

## ●アルコール過敏症

この薬は水に溶けにくいため、アルコールを使って溶かしています。注射時のアルコール消毒で皮膚が赤くなる方、少量の飲酒で顔や全身が赤くなったり、具合が悪くなったりする方はお知らせください

\*自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう注意すること。


\*上記症状が現れたときは、必ず医師・看護師・薬剤師にご相談下さい。

## ◎副作用の発現時期の目安

\*この図は、今回用いられている抗癌剤による副作用だけでなく、他の抗癌剤によって起こる副作用も含まれています。

これらの副作用がすべてあらわれるわけではありません。

また、発現する時期や程度も抗がん剤の種類や患者さんの体質により個人差があります。



## ◎副作用の対策について

★吐き気・嘔吐、下痢と便秘、口内炎、感染症、出血、貧血、脱毛などの副作用の対策について知りたい方は、資料をお渡しすることができますのでお申し出下さい。

## ◎薬品毎の副作用について（添付文書における重大な副作用を製薬会社作成「薬のしおり」などから抜粋）

まれな副作用ですが、この様な症状が現れた際には医師・薬剤師・看護師へご相談下さい。

### 【キートルーダ】

[間質性肺疾患]発熱、から咳、息苦しい

[大腸炎、小腸炎、重度の下痢]嘔吐（おうと）、腹痛、下痢、泥状の便

[中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑]まぶたや眼の充血、唇や口内のただれ、発疹、みずぶくれ、発熱

[類天疱瘡]かゆみの激しい水疱

[神経障害]運動のまひ、手足のしびれ、指先のしびれ、歩行困難

[劇症肝炎、肝不全、肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎]食欲不振、吐き気、嘔吐、からだがだるい、白目や皮膚が黄色くなる、かゆみ、発熱、右上腹部の痛み

[甲状腺機能障害]汗をかきやすい、胸がドキドキする、からだがだるい、寒がりになる

[下垂体機能障害]からだがだるい、頭がぼーっとしたり意識がなくなったりする、血圧低下

[副腎機能障害]からだがだるい、意識がうされる、低血压

[1型糖尿病]からだがだるい、のどの渴き、尿の量が増える、意識の低下

[腎障害]むくみ、頭痛、尿量が減る

[膀胱炎]吐き気、嘔吐、胃・おなかの激しい痛み、背中の痛み

[筋炎、横紋筋融解症]脱力感、筋肉の痛み、息苦しい、赤褐色尿

[重症筋無力症]まぶたが重い、上まぶたが下がる、物がだぶって見える、筋肉の疲労感

[心筋炎]からだがだるい、発熱、吐き気、息苦しい

[脳炎、髄膜炎]発熱、頭痛、意識の低下

[重篤な血液障害]貧血症状、発熱、出血傾向

[血球貪食症候群]発熱、左上腹部の圧迫感や痛み、リンパ節のはれ

[結核]長引く微熱・咳、からだがだるい、体重減少

[インフュージョン・リアクション]呼吸困難、意識障害、まぶた・唇・舌のはれ

[ぶどう膜炎]目のかすみ、視力の低下、蚊が眼の前を飛んでいるように見える、まぶしい、眼の痛み、眼の充血

### 【パクリタキセル】

[ショック、アナフィラキシー様症状]急に呼吸が困難になる、胸痛、血圧低下、脈が速くなるあるいは遅くなる、顔などがほてる、むくみ、発汗

[白血球減少などの骨髓抑制]熱がある、さむけがする、のどが痛い、咳が出る、排尿時痛、出血しやすい、血が止まりにくい、貧血

[末梢神経障害、麻痺]手足の痺れ、服のボタンかけができない、手先の細かい作業に支障

[間質性肺炎、肺線維症]咳が続く、息苦しい、発熱

[急性呼吸窮迫症候群]急に呼吸が困難になる

[心筋梗塞、うつ血性心不全、心伝導障害、肺塞栓、血栓性靜脈炎、脳卒中、肺水腫]動悸、息切れ、胸痛、息苦しい

[難聴、耳鳴]聞こえにくい、耳鳴りがする

[消化管壞死、消化管穿孔、消化管出血、消化管潰瘍]激しい腹痛、下血

[重篤な腸炎]激しい腹痛、下痢

[腸管閉塞、腸管麻痺]食欲不振、恶心・嘔吐、著しい便秘、腹痛、腹部膨満

[肝機能障害、黄疸]黄疸が出来る

[膵炎]上腹部の激痛

[急性腎障害]尿が出なくなる、血尿が出る

[播種性血管内凝固症候群]手足に輪状の紅斑、発熱、下痢、やけどのような症状

[皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死融解症]出血しやすい、血が止まりにくい

[腫瘍崩壊症候群]尿量が減る

[白質脳症（可逆性後白質脳症症候群を含む）]歩行時のふらつき、口のもつれ、物忘れ、動作緩慢などの症状

### ◎ 上記のほかにも副作用が現れることがあります。

他にもからだの異常を感じたら、主治医や薬剤師、看護師に相談してください。