

< あなたの治療について >

呼内-Atezo/CBDCA/VP16-SCLC-q3w

今回の治療は、Atezo/CBDCA/VP16療法という治療法で、テセントリク(ATZ)とカルボプラチン(CBDCA)とエトボシド(VP16)という3種類の注射薬を併用して行います。テセントリク、カルボプラチン、エトボシドは、いずれも腫瘍の増殖を抑えるお薬です。3つの薬を組み合わせることで、より効果を高めることができます。

治療全体の流れ

今回の化学療法は3週間が1コースとなっています。各コースの1日目に点滴を行います。この治療を3週間(21日間)ごとに4回繰り返します。副作用が強く出たり、体調がすぐれない場合は回復するまで、治療を延期したり、お薬の量を減らしたりすることがあります。

1コース分の治療スケジュール

薬剤商品名 (薬の作用)	投与	1日目	2~3日目	4~21日目
アプレピタント (吐き気止め)	内服	125	80	お休み

アプレピタントは症状に応じて上記日数を超えることがあります。

順序	薬剤商品名 (薬の作用)	投与	1日目	2日目	3日目	4~21日目
	テセントリク (抗がん剤) 1200mg/body	点滴 初回 60分 2回目以降 30分		お休み	お休み	お休み
	アロキシ デキサート (吐き気止め)	点滴 約30分		お休み	お休み	
	デキサート (吐き気止め)	点滴 約30分	お休み			
	エトボシド (抗がん剤) 100mg/m ²	点滴 約1時間				
	カルボプラチン (抗がん剤) 5AUC	点滴 約1時間		お休み	お休み	

点滴中や点滴後に、注射部位が痛い、赤くなってはれる、水ぶくれができる、ただれるなどの症状に気づいたときは、すぐに申し出てください。また点滴中は、腕を動かすことにより針がずれ、点滴漏れが生ずることがありますので気をつけて下さい。

起こりやすい副作用について(頻度20%以上)

カルボプラチン・エトボシドについて

白血球減少、血小板減少、ヘモグロビン減少、赤血球減少、ヘマトクリット値減少
嘔気・嘔吐、食欲不振 脱毛

特徴的な副作用について

テセントリクにおける

間質性肺疾患

「発熱、から咳、息苦しい」などの症状

肝障害

「発熱（38～39℃）、ぶつぶつ様の発疹、食欲がなくなる、気分が悪くなる、下痢になる、したいに強くなる全身のたるさ、皮膚や白目が黄色くなる、体がかゆい」などの症状

甲状腺機能障害、下垂体機能障害、副腎機能障害

「全身倦怠感、むくみ、発汗、体重減少、意識がうすれる、血圧低下」などの症状

Infusion reaction

「発熱、悪寒、そう痒症、発疹、高血圧、低血圧、呼吸困難等」などの症状


*** 上記症状が現れたときは、必ず医師・看護師・薬剤師にご相談下さい。**

副作用の発現時期の目安

*この図は、今回用いられている抗癌剤による副作用だけでなく、他の抗癌剤によって起こる副作用も含まれています。

これらの副作用がすべてあらわれるわけではありません。

また、発現する時期や程度も抗がん剤の種類や患者さんの体質により個人差があります。



副作用の対策について

吐き気・嘔吐、下痢と便秘、口内炎、感染症、出血、貧血、脱毛などの副作用の対策について知りたい方は、資料をお渡しすることができますのでお申し出下さい。

薬品毎の副作用について（添付文書における重大な副作用を製薬会社作成「薬のしおり」などから抜粋）

まれな副作用ですが、このような症状が現れた際には医師・薬剤師・看護師へご相談下さい。

【テセントリク】

<間質性肺疾患>発熱、から咳、息苦しい

<肝機能障害、肝炎>からだかたまり、白目が黄色くなる、かゆみ

<大腸炎、重度の下痢>嘔吐（おうと）、腹痛、下痢、泥状の便

<膵炎>吐き気、嘔吐、胃・おなかの激しい痛み、背中痛み

<1型糖尿病>からだがだるい、のどの渇き、尿の量が増える、意識の低下
<甲状腺機能障害>汗をかきやすい、胸がドキドキする、からだがだるい、寒がりになる
<副腎機能障害>からだがだるい、意識がうすれる、低血圧
<下垂体機能障害>からだがだるい、頭がぼーっとしたり意識がなくなったりする、血圧低下
<脳炎、髄膜炎>発熱、頭痛、意識の低下
<神経障害>運動のまひ、手足のしびれ、指先のしびれ、歩行困難
<重症筋無力症>まぶたが重い、上まぶたが下がる、物がだぶって見える、筋肉の疲労感
<中毒性表皮壊死症候群、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑>まぶたや眼の充血、唇や口内のただれ、発疹、みずぶくれ
<腎障害>むくみ、頭痛、尿量が減る
<筋炎、横紋筋融解症>脱力感、筋肉の痛み、息苦しい、赤褐色尿
<インフュージョン・リアクション>呼吸困難、意識障害、まぶた・唇・舌のはれ
<発熱性好中球減少症>熱が出る、体がだるい、のどが痛いなどのかぜのような症状

【カルボプラチン】

<汎血球減少等の骨髄抑制> 発熱、悪寒、咳、鼻水が出る、めまい、出血しやすい、血が止まりにくい、あざができる、体がだるい、疲れやすい、息切れ、のどの痛み
<ショック・アナフィラキシー様症状> 唇や爪などが青紫色になる、胸や息が苦しくなる、急に気分が悪くなる、めまいがする
<間質性肺炎> 発熱、咳、胸や息が苦しくなる
<急性腎不全> 尿の出が悪くなる、血尿が出る
<肝不全、肝機能障害、黄疸> 黄疸が出る
<消化管壊死、消化管穿孔、消化管出血、消化管潰瘍> 激しい腹痛、下血
<脳梗塞、肺梗塞> 意識の低下、手足のしびれ、息苦しい
<血栓・塞栓症> 手足のしびれ、息苦しい
<心筋梗塞、うっ血性心不全> 動悸、息切れ、胸が痛い、苦しい
<溶血性尿毒症症候群> 出血しやすい、血が止まりにくい、尿の出が悪くなる、皮膚や白目が黄色くなる、めまいがする、皮膚に紫色の斑点ができる
<急性呼吸窮乏症候群> 急に呼吸が困難になる
<播種性血管内凝固症候群> 出血しやすい、血が止まりにくい
<急性膵炎> 上腹部の激痛
<出血性腸炎、偽膜性大腸炎> 激しい腹痛、下痢
<麻痺性イレウス> 食欲不振、悪心・嘔吐、著しい便秘、腹痛、腹部の膨満、腸内容物のうっ滞

【エトボシド】

<骨髄抑制> いつもより強く体がだるく感じる。38度以上の熱がある。
<ショック> 休に気分が悪くなったり、安静にしてもめまいがする。
<間質性肺炎> 咳き込んだり、息苦しい。
<過敏症> 発疹、痒み、蕁麻疹など。

上記のほかにも副作用が現れることがあります。

他にもからだの異常を感じたら、主治医や薬剤師、看護師に相談してください。