

# 一宮市立市民病院

## 医薬品情報室(DI 室)だより Vol.1




一宮市立市民病院 薬剤局 医薬品情報室(以下 DI 室)では、医療従事者等からの問い合わせ内容の一部を電子化にて保存しております。

今回、2001年2月から2014年7月までの期間に DI 室にて対応を行った、

**「1,717 件」** の問い合わせ内容を項目ごとに分類し集計いたしました。

その中で、問い合わせ件数が多かった**「3項目」**における実際の問い合わせ内容を、一部以下にご紹介いたします。

### ～ 問い合わせ内容項目と件数 ～



#### ① 用法・用量など

##### 問い合わせ内容 例①

**「ジスロマック®SR 成人用ドライシロップ」が  
空腹時投与である理由は何ですか？**

(回答)

下痢、腹痛等の消化管系の有害事象の発現率が食後投与で増加したためです。AUC は食後投与と空腹時投与で同等であり、食事の影響はありません。

※参考:ジスロマック®SR 成人用ドライシロップ 2g インタビューフォーム

## ②併用・相互作用など

### 問い合わせ内容 例②

**「アンカロン<sup>®</sup>錠」と「ワーファリン<sup>®</sup>錠」の  
相互作用について教えてください。**

(回答)

併用注意となります。アンカロン<sup>®</sup>錠がワーファリン<sup>®</sup>錠の肝薬物代謝酵素 CYP2C9 を阻害することによりワーファリン<sup>®</sup>錠の作用が増強されます。また、アンカロン<sup>®</sup>錠の甲状腺機能異常の副作用により甲状腺機能が亢進するとワーファリン<sup>®</sup>錠の作用が増強されます。併用する場合には、ワーファリン<sup>®</sup>錠を 1/3～1/2 へ減量することも考慮し、血液凝固能のモニタリングをお願いします。

※参考:各薬剤添付文書

## ③副作用について

### 問い合わせ内容 例③

**下痢症状のため「リウマトレックス<sup>®</sup>カプセル」を休薬した場合、  
再開のタイミングはどのようにしたらよいですか？**

(回答)

決まった日に服用できなかった場合には次回服用予定日までスキップし、服用曜日・時間は変更せずに服用してください。1 週間程度であれば関節リウマチの活動性に大きく影響しないと考えられています。

※参考:リウマトレックス<sup>®</sup>カプセル 2mg 適正使用ガイド

### (補足) リウマトレックス<sup>®</sup>カプセルの消化器症状について

リウマトレックス<sup>®</sup>カプセル服用中に消化管障害(口内炎、激しい腹痛、嘔吐、下痢等)があらわれた場合は、リウマトレックス<sup>®</sup>カプセルの投与を中止し、拮抗剤であるロイコボリン<sup>®</sup>錠を投与するとともに、症状の程度により適切な処置を行う。

軽度の消化管障害の場合には、分割することで1回の服用量を減量する、あるいは週単位の投与量を減量することで、軽減あるいは改善することがある。

また、発現の予防には、葉酸の投与が有効であるとの報告がある。