

外来化学療法を行っている患者さんへの情報提供について

当院化学療法センターでは、日本医療薬学会認定がん専門薬剤師・日本病院薬剤師会認定がん薬物療法認定薬剤師により抗がん剤治療の事前説明や服薬指導を行っています。

その際に、「がん患者指導管理加算料ハ」に用いる説明文書として「情報提供用シール」を患者さんにお渡ししています。

▶ がん患者指導管理加算料ハとは・・・


「悪性腫瘍と診断された患者のうち、抗悪性腫瘍剤を投薬又は注射されている者（予定を含む。）に対して、患者の心理状態に十分配慮された環境で、がん診療の経験を有する医師又は抗悪性腫瘍剤に係る業務に従事した経験を有する専任の薬剤師が適宜必要に応じてその他の職種と共同して、抗悪性腫瘍剤の投薬若しくは注射の開始日前 30 日以内、又は投薬若しくは注射をしている期間に限り、薬剤の効能・効果、服用方法、投与計画、副作用の種類とその対策、日常生活での注意点、副作用に対応する薬剤や医療用麻薬等の使い方、他の薬を服用している場合は薬物相互作用等について文書により説明を行った場合に算定することが出来る診療報酬点数です。」

当院薬剤局の取り組みとして、抗がん剤治療の説明は治療レジメン毎に作成した説明用紙「あなたの治療について」を使用し、副作用に対する支持療法薬や相互作用に関する情報には「情報提供用シール」を使用して患者さんへ服薬指導を行っています。

情報提供用シールは、お薬手帳に貼付できるサイズでの説明文書となっており、調剤薬局の先生方への情報提供と薬剤交付時の服薬指導の際に使用して頂けるような内容となっております。

当院化学療法センターで抗がん剤治療を行っている患者さんが院外処方箋を持参された際には、情報提供用シールを確認して頂き、先生方からも再度服薬指導や日常生活での注意点のアドバイスを行って頂くことで地域のがん治療の向上につながっていくと考えております。

ご協力をお願い致します。

<h3>吐き気・嘔吐を予防する飲み薬①</h3> <p>◎症状がなくても用法用量をしっかりと守って服用してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● イメンドカプセル125mg *治療当日に看護師の指示で1カプセル服用します。 ● イメンドカプセル80mg 朝食後 1カプセル *治療日の翌日・翌々日 ● デカドロン錠0.5mg 1回 ()錠 ()食後 *治療の翌日から()日間 <p>◎吐き気が出たときは追加の吐き気止めを使用し、症状を和らげます。</p> <p>一宮市立市民病院 薬剤局</p> 	<h4>薬剤師からの説明内容</h4> <p>年 月 日</p> <p>書記載 <input type="checkbox"/>印刷貼付 <input type="checkbox"/>手書・印刷併用</p> <p>紙説明 <input type="checkbox"/>手帳利用による口頭説明</p> <p>已管理 <input type="checkbox"/>家 族 その他(管理者: ())</p> <p><input type="checkbox"/>あり <input type="checkbox"/>なし</p> <p>注意点等</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年.月.日</th> <th>処方内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <h4>吐き気・嘔吐を予防する飲み薬①</h4> <p>◎症状がなくても用法用量をしっかりと守って服用してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● イメンドカプセル125mg *治療当日に看護師の指示で1カプセル服用します。 ● イメンドカプセル80mg 朝食後 1カプセル *治療日の翌日・翌々日 ● デカドロン錠0.5mg 1回 ()錠 ()食後 *治療の翌日から()日間 <p>◎吐き気が出たときは追加の吐き気止めを使用し、症状を和らげます。</p> <p>一宮市立市民病院 薬剤局</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">【医師・歯科医師・薬剤師からのコメント】</td> </tr> <tr> <td colspan="2">年 月 日 記録者:</td> </tr> </tbody> </table>	年.月.日	処方内容		<h4>吐き気・嘔吐を予防する飲み薬①</h4> <p>◎症状がなくても用法用量をしっかりと守って服用してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● イメンドカプセル125mg *治療当日に看護師の指示で1カプセル服用します。 ● イメンドカプセル80mg 朝食後 1カプセル *治療日の翌日・翌々日 ● デカドロン錠0.5mg 1回 ()錠 ()食後 *治療の翌日から()日間 <p>◎吐き気が出たときは追加の吐き気止めを使用し、症状を和らげます。</p> <p>一宮市立市民病院 薬剤局</p>	【医師・歯科医師・薬剤師からのコメント】		年 月 日 記録者:	
年.月.日	処方内容									
	<h4>吐き気・嘔吐を予防する飲み薬①</h4> <p>◎症状がなくても用法用量をしっかりと守って服用してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● イメンドカプセル125mg *治療当日に看護師の指示で1カプセル服用します。 ● イメンドカプセル80mg 朝食後 1カプセル *治療日の翌日・翌々日 ● デカドロン錠0.5mg 1回 ()錠 ()食後 *治療の翌日から()日間 <p>◎吐き気が出たときは追加の吐き気止めを使用し、症状を和らげます。</p> <p>一宮市立市民病院 薬剤局</p>									
【医師・歯科医師・薬剤師からのコメント】										
年 月 日 記録者:										