

新規採用医薬品 No. 126

2022 年 10 月

一宮市立市民病院
薬 剤 局

【新規採用医薬品】

オンジェンティス錠 25mg

小野薬品工業

組成：1 錠中 オピカポン 25mg

効能・効果：レボドパ・カルビドパ又はレボドパ・ベンセラジド塩酸塩との併用によるパーキンソン病における症状の日内変動（wearing-off 現象）の改善

用法・用量：本剤は、レボドパ・カルビドパ又はレボドパ・ベンセラジド塩酸塩と併用する。通常、成人にはオピカポンとして 25mg を 1 日 1 回、レボドパ・カルビドパ又はレボドパ・ベンセラジド塩酸塩の投与前後及び食事の前後 1 時間以上あけて経口投与する。

1. 本剤はレボドパの代謝酵素であるカテコール-*O*-メチルトランスフェラーゼ（catechol-*O*-methyltransferase : COMT）を阻害することでレボドパの生物学的利用率を増大させ、血漿中レボドパの脳内移行を効率化することを目的に創製された末梢性の COMT 阻害剤である。
2. 本剤は患者の服薬利便性の向上を目指して開発された 1 日 1 回服用の製剤である。
3. 本剤は生活習慣、レボドパ含有製剤の投与時間帯等を考慮して適切な投与時間（就寝前等）を定め、毎日一定の時間帯に投与する製剤である。
4. 薬価は 1 錠 957.4 円。

ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター

旭化成ファーマ

組成：1 キット中 サリルマブ（遺伝子組換え）200mg

効能・効果：既存治療で効果不十分な関節リウマチ

用法・用量：通常、成人にはサリルマブ（遺伝子組換え）として 1 回 200mg を 2 週間隔で皮下投与する。なお、患者の状態により 1 回 150mg に減量すること。

1. 本剤は可溶性及び膜結合型インターロイキン-6（IL-6）受容体 α サブユニットに特異的に結合し、IL-6 の作用を抑制するヒト型抗ヒト IL-6 受容体モノクローナル抗体である。
2. 本剤はあらかじめ 1 回量の薬剤が充填されており、リング式のキャップを外し、本体を皮膚に押しあてるだけで、注射針が患者の目に触れることなく自動的に皮膚に刺さり薬液が注入される使い捨てタイプの製剤である。

3. 本剤はリウマチ患者が扱いやすい形状・機能を追求した User Centered Design (ユーザー中心設計)のコンセプトに基づき設計された製剤である。
4. 本剤は過去の治療において、少なくとも1剤の抗リウマチ薬による適切な治療を行っても、効果不十分な場合に投与する製剤である。
5. 本剤は在宅自己注射指導管理料の対象薬剤である。
6. 薬価は 1キット 47,958 円。

ジセラカ錠 100mg

エーザイ

組成：1錠中 フィルゴチニブマレイン酸塩 127.24mg (フィルゴチニブとして100mg)

効能・効果：既存治療で効果不十分な関節リウマチ (関節の構造的損傷の防止を含む) 中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療及び維持療法 (既存治療で効果不十分な場合に限る)

用法・用量：

〈関節リウマチ〉

通常、成人にはフィルゴチニブとして200mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態に応じて100mgを1日1回投与できる。

〈潰瘍性大腸炎〉

通常、成人にはフィルゴチニブとして200mgを1日1回経口投与する。なお、維持療法では、患者の状態に応じて100mgを1日1回投与できる。

1. 本剤は経口投与可能なヤヌスキナーゼ (Janus Kinase: JAK) に対する阻害剤である。
2. 本剤は JAK ファミリーを選択的に阻害することで、インターロイキン-6 (IL-6) を含むサイトカイン誘導性の炎症性シグナル伝達を抑制する製剤である。
3. 本剤を関節リウマチで投与する場合、過去の治療において少なくとも1剤の抗リウマチ薬等による治療を行っても、疾患に起因する明らかな症状が残る場合に投与する製剤である。
4. 本剤を潰瘍性大腸炎で投与する場合、少なくとも1剤の既存治療 (ステロイド、免疫抑制剤等) による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与する製剤である。
5. 本剤投与時に播種性を含む帯状疱疹等のウイルスの再活性化が報告されているため、ヘルペスウイルス等の再活性化の徴候や症状の発現が認められた場合には、患者に受診するよう説明を行うとともに、本剤の投与を中断し速やかに適切な処置を行う必要のある製剤である。
6. 薬価は 1錠 2,519.9 円。

ヌーカラ皮下注 100mg ペン

グラクソ・スミスクライン

組成：1キット (ペン) 中 メボリズマブ (遺伝子組換え) 100mg

効能・効果：気管支喘息 (既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る)

既存治療で効果不十分な好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

用法・用量：

〈気管支喘息〉

通常、成人及び12歳以上の小児にはメポリズマブ（遺伝子組換え）として1回100mgを4週間ごとに皮下に注射する。

〈好酸球性多発血管炎性肉芽腫症〉

通常、成人にはメポリズマブ（遺伝子組換え）として1回300mgを4週間ごとに皮下に注射する。

1. 本剤は血中及び組織中好酸球を調節する主なサイトカインであるヒトインターロイキン5（IL-5）に高い特異性及び親和性で結合するヒト化モノクローナル抗体である。
2. 本剤は好酸球表面に発現するIL-5受容体複合体の α 鎖にIL-5が結合するのを阻止し、IL-5のシグナル伝達を阻止して、好酸球の増殖、分化、浸潤、活性化及び生存を抑制し、気管支喘息患者及び好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis：EGPA）患者の末梢血中及び組織中好酸球数を減少させる製剤である。
3. 本剤は凍結乾燥注射剤における溶解操作及び薬液の計量・採取が不要となるため、簡便な操作で投与することが可能な製剤である。
4. 本剤をEGPAに使用する場合、100mgずつ3カ所に分けて投与し、各注射部位は5cm以上離す必要がある。
5. 本剤は在宅自己注射指導管理料の対象薬剤である。
6. 薬価は 1キット 159,891 円。

メラトベル顆粒小児用0.2%

ノーベルファーマ

組成：1g中 メラトニン2mg

効能・効果：小児期の神経発達症に伴う入眠困難の改善

用法・用量：通常、小児にはメラトニンとして1日1回1mgを就寝前に経口投与する。

なお、症状により適宜増減するが、1日1回4mgを超えないこと。

1. 本剤は日本で初めて内因性ホルモンと同一の化学構造式を持つメラトニンを有効成分とした入眠改善剤である。
2. 本剤は主に視交叉上核によって制御される睡眠・覚醒を含む概日リズムの維持・調整に関与することにより、入眠潜時（入床から入眠するまでの時間）を短縮する製剤である。
3. 本剤は小児用製剤のため、服用のしやすさを考慮した顆粒剤である。
4. 本剤は最高血中濃度が低下するおそれがあるため、食事と同時又は食直後の服用は避ける必要のある製剤である。
5. 本剤の6歳未満又は16歳以上の患者における有効性及び安全性は確率していない。
6. 薬価は 1g 207.7 円。

【正規採用規格追加医薬品】

イオパミロン注 370 シリンジ 80mL

バイエル薬品

1. イオパミロン注 370 シリンジ 100mL は既採用。
2. 薬価は 1筒 3,297 円。

フルカリック 3号輸液

テルモ

1. フルカリック 1号、2号輸液は既採用。
2. 薬価は 1キット 982 円。

【正規採用規格変更医薬品】

ゾレア皮下注 150mg シリンジ

ノバルティスファーマ

1. 本剤はゾレア皮下注 75mg シリンジからの変更である。
2. 薬価は 1筒 29,147 円。

ビレーズトリエアロスフィア 120 吸入

アストラゼネカ

1. 本剤はビレーズトリエアロスフィア 56 吸入からの変更である。
2. 薬価は 1キット 8,771.9 円。

【正規採用剤型追加医薬品】

ネリゾナ軟膏 0.1%

LTL ファーマ

1. ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1%は既採用。
2. 薬価は 1本 (5g) 105 円。

ベンリスタ点滴静注用 120mg

グラクソ・スミスクライン

1. ベンリスタ皮下注 200mg オートインジェクターは既採用。
2. 薬価は 1瓶 16,618 円。

【正規採用剤型変更医薬品】

ミネプロ OD錠 2.5mg

第一三共

1. 本剤はミネプロ錠 2.5mg からの変更である。
2. 本剤は舌の上のせて唾液を浸潤させると崩壊するため、水なしで服用可能な製剤である。
3. 薬価は 1錠 91.6 円。

【院外専用採用から正規採用への

切り替え医薬品】

ボラザ G坐剤

天藤製薬

1. 薬価は 1個 28.3 円。

【先発品から後発品への切り替え医薬品】

アザシチジン注射用 100mg「サワイ」

沢井製薬

1. 本剤はビダーザ注射用 100mg からの切り替えである。
2. 薬価は 1瓶 15,425 円。

アトモキセチンカプセル 5mg・10mg・25mg「サワイ」

沢井製薬

1. 本剤はストラテラカプセル 5mg・10mg・25mg からの切り替えである。
2. アトモキセチンカプセル 25mg「サワイ」は特定患者臨時採用薬である。
3. 薬価は 5mg 1Cp 66.5 円、10mg 1Cp 76.8 円、25mg 1Cp 96.5 円。

アナストロゾール錠 1mg「NK」

日本化薬

1. 本剤はアリミデックス錠 1mg からの切り替えである。
2. 薬価は 1錠 88.7 円。

アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」

日医工

1. 本剤はシンメトレル錠 50mg からの切り替えである。
2. 薬価は 1錠 5.9 円。

イグラチモド錠 25mg 「サワイ」

沢井製薬

1. 本剤はケアラム錠 25mg からの切り替えである。
2. 薬価は 1錠 56.1 円。

イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「日医工」

日医工

1. 本剤はセロクラール錠 20mg からの切り替えである。
2. 薬価は 1錠 5.9 円。

エスエーワン配合 OD 錠 T20・25

沢井製薬

1. 本剤はティーエスワン配合 OD 錠 T20・25 からの切り替えである。
2. 薬価は T20 1錠 169.4 円、T25 1錠 143.5 円。

エスタゾラム錠 2mg 「アメル」

共和薬品工業

1. 本剤はユーロジン 2mg 錠からの切り替えである。
2. 薬価は 1錠 8.4 円。

エンテカビル錠 0.5mg 「トーワ」

東和薬品

1. 本剤はバラクルード錠 0.5mg からの切り替えである。
2. 薬価は 1錠 106.8 円。

オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2g 「ニプロ」

ニプロ

1. 本剤はロトリガ粒状カプセル 2g からの切り替えである。
2. 薬価は 1包 98.2 円。

グリメピリド錠 1mg 「トーワ」

東和薬品

1. 本剤はアマリール錠 1mg からの切り替えである。
2. 薬価は 1錠 10.1 円。

クリンダマイシン注射液 300mg 「NIG」

日医工

1. 本剤はダラシン S 注射液 300mg からの切り替えである。
2. 薬価は 1Ap 128 円。

クレンブテロール錠 10 μ g 「ハラサワ」

日本ジェネリック

1. 本剤はスピロベント錠 10 μ g からの切り替えである。
2. 薬価は 1錠 5.8 円。

ソタロール塩酸塩錠 40mg 「TE」

トーアエイヨー

1. 本剤はソタコール錠 40mg からの切り替えである。
2. 薬価は 1 錠 56.2 円。

デクスメトミジン静注液 200 μ g 「サンド」

サンド

1. 本剤はプレセデックス静注液 200 μ g 「ファイザー」からの切り替えである。
2. 本剤は「集中治療における人工呼吸中及び離脱後の鎮静」において、6 歳以上の小児への適応を有さない製剤である。
3. 薬価は 1 瓶 1,364 円。

トラマドール塩酸塩 OD 錠 25mg 「K0」

寿製薬

1. 本剤はトラマール OD 錠 25mg からの切り替えである。
2. 薬価は 1 錠 12.6 円。

トルバプタン OD 錠 7.5mg 「TE」

トーアエイヨー

1. 本剤はサムスカ OD 錠 7.5mg からの切り替えである。
2. 本剤は先発品「サムスカ OD 錠 7.5mg」と適応相違のある製剤である。
3. 薬価は 1 錠 491.6 円。

ニコランジル点滴静注用 12mg・48mg 「サワイ」

沢井製薬

1. 本剤はシグマート注 12mg・48mg からの切り替えである。
2. ニコランジル点滴静注用 12mg 「サワイ」は循環器内科限定採用薬である。
2. 薬価は 12mg 1 瓶 402 円、48mg 1 瓶 1,251 円。

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム 0.05% 「MYK」

日医工

1. 本剤はアンテベートクリーム 0.05%からの切り替えである。
2. 薬価は 1 本 (5g) 52 円。

ラメルテオン錠 8mg 「武田テバ」

武田テバファーマ

1. 本剤はロゼレム錠 8mg からの切り替えである。
2. 本剤はオーソライズドジェネリックで先発品と原薬・添加物・製造方法等が同一の製剤である。
3. 薬価は 1 錠 27.9 円。

ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg 「サワイ」

沢井製薬

1. 本剤はロペミンカプセル 1mg からの切り替えである。
2. 薬価 1Cp 6.2 円。

【正規採用製造中止等に伴う切り替え医薬品】

エスゾピクロン錠 1mg「日新」

日新製薬

1. 本剤はエスゾピクロン錠 1mg「DSEP」からの切り替えである。
2. 薬価は 1錠 13.3 円。

オゼンピック皮下注 2mg

ノボ ノルディスクファーマ

1. 本剤はオゼンピック SD 皮下注 0.25mg からの変更である。
2. 薬価は 1キット 11,008 円。

セファゾリンナトリウム注射用 1g「日医工」

日医工

1. 本剤はセファゾリン Na 注射用 1g「NP」からの切り替えである。
2. 薬価は 1瓶 263 円。

ナファモスタットメシル酸塩注用 10mg「トーワ」

東和薬品製薬

1. 本剤はナファモスタットメシル酸塩注射用 10mg「旭化成」からの切り替えである。
2. 薬価は 1瓶 197 円。

ナフトピジル OD 錠 25mg「FFP」

共創未来ファーマ

1. 本剤はナフトピジル錠 25mg「ファイザー」からの変更である。
2. 本剤は舌の上への唾液を浸潤させ舌で軽くつぶすことにより崩壊するため、水なしで服用可能である。
3. 薬価は 1錠 10.1 円。

尿素クリーム 20%「SUN」

サンファーマ

1. 本剤は尿素クリーム 20%「フジナガ」からの切り替えである。
2. 薬価は 1本 (25g) 100 円。

フィルグラスチム BS 注 75 μ g・300 μ g シリンジ「F」

富士製薬工業

1. 本剤はフィルグラスチム BS 注 75 μ g・300 μ g シリンジ「モチダ」からの切り替えである。
2. 薬価は 75 μ g 1筒 2,510 円、300 μ g 1筒 6,522 円。

【院外専用採用医薬品】

ミヤBM細粒

ミヤリサン製薬

組成：1g 中 宮入菌末 40mg

効能・効果：腸内菌叢の異常による諸症状の改善

用法・用量：通常、成人 1日 1.5～3g を 3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

1. 本剤の主成分である酪酸菌（宮入菌）は芽胞として配合されていることから、投与後、胃液や胆汁酸、腸液、消化酵素などの影響を受けずに腸に到達する製剤である。
2. 一般的に乳酸菌類は強酸性下の胃液中において死滅するのに対して、本菌はほとんど影響を受けないこと、抗生物質投与時に起こる下痢などの諸症状に対して改善効果を示すこと、さらに本菌自体の作用のみならず、本菌の主要代謝産物である酪酸による腸粘膜委縮改善作用などの特徴を有する製剤である。
3. 薬価は 1g 6.3円。

モイゼルト軟膏1%

大塚製薬

組成：1g 中 ジファミラスト 10mg

効能・効果：アトピー性皮膚炎

用法・用量：通常、成人には1%製剤を1日2回、適量を患部に塗布する。

通常、小児には0.3%製剤を1日2回、適量を患部に塗布する。症状に応じて、1%製剤を1日2回、適量を患部に塗布することができる。

1. 本剤はホスホジエステラーゼ4（PDE4）の酵素活性を選択的に阻害し、炎症細胞の細胞内 cAMP 濃度を高め種々のサイトカイン及びケモカインの産生を制御することにより皮膚の炎症を抑制する、本邦初の外用 PDE4 阻害剤である。
2. 本剤の塗布量は、皮疹の面積 0.1 m²あたり 1g を目安とする製剤である。
3. 本剤は 2022 年 11 月末日まで市販直後調査の対象品目となっている。
4. 本剤は 2023 年 5 月末日まで上限投与日数 14 日が設けられている。
5. 薬価は 1本（10g） 1,521円。

ロゼックスゲル0.75%

マルホ

組成：1g 中 メトロニダゾール 7.5mg

効能・効果：がん性皮膚潰瘍部位の殺菌・臭気の軽減
酒さ

用法・用量：

〈がん性皮膚潰瘍部位の殺菌・臭気の軽減〉

症状及び病巣の広さに応じて適量を使用する。潰瘍面を清拭後、1日1～2回ガーゼ等にのばして貼付するか、患部に直接塗布しその上をガーゼ等で保護する。

〈酒さ〉

1日2回、患部を洗淨後、適量を塗布する。

1. 本剤は国内で初めて「がん性皮膚潰瘍部位の殺菌・臭気の軽減」を効能・効果として承認されたメトロニダゾールを有効成分とする水性ゲル製剤である。
2. 本剤は紫外線照射により不活性体に転換され、効果が減弱することがあるため、本剤の使用中は、日光又は日焼けランプ等による紫外線曝露を避ける必要のある製剤である。
3. 本剤は2022年11月末日まで(対象:酒さ)市販直後調査の対象品目となっている。
4. 薬価は 1本(15g) 1,534.5円。

【正規採用削除医薬品】

<u>アマリール錠 1mg</u>	サノフィ
<u>アリミデックス錠 1mg</u>	アストラゼネカ
<u>アンテベートクリーム 0.05%</u>	鳥居薬品
<u>アンテベート軟膏 0.05%</u>	鳥居薬品
<u>エスゾピクロン錠 1mg 「DSEP」</u>	第一三共エスファ
<u>オゼンピック SD 皮下注 0.25mg</u>	ノボ ノルディスクファーマ
<u>オムニパーク 350 注シリンジ 70mL</u>	GEヘルスケアファーマ
<u>オルガラン静注 1250 単位</u>	ネオクリティケア製薬
<u>ケアラム錠 25mg</u>	エーザイ
<u>コンファクトF 注射用 1000 単位</u>	日本血液製剤機構
<u>サムスカ OD 錠 7.5mg</u>	大塚製薬
<u>シグマート注 12mg</u>	中外製薬
<u>シグマート注 48mg</u>	中外製薬
<u>シンメトレル錠 50mg</u>	サンファーマ
<u>ストラテラカプセル 5mg</u>	日本イーライリリー
<u>ストラテラカプセル 10mg</u>	日本イーライリリー
<u>スピロペント錠 10μg</u>	帝人ファーマ
<u>セファゾリン Na 注射用 1g 「NP」</u>	ニプロ
<u>セロクラール錠 20mg</u>	日医工
<u>ソタコール錠 40mg</u>	サンド
<u>ゾレア皮下注 75mg シリンジ</u>	ノバルティスファーマ
<u>ダラシン S 注射液 300mg</u>	ファイザー
<u>ティーエスワン配合 OD 錠 T20</u>	大鵬薬品工業
<u>ティーエスワン配合 OD 錠 T25</u>	大鵬薬品工業

<u>トラマール OD 錠 25mg</u>	ファイザー
<u>ナファモスタットメシル酸塩注射用 10mg 「旭化成」</u>	旭化成ファーマ
<u>ナフトピジル錠 25mg 「ファイザー」</u>	ファイザー
<u>尿素クリーム 20% 「フジナガ」</u>	第一三共
<u>ネリプロクト坐剤</u>	LTL ファーマ
<u>ハイカリック NC-H 輸液</u>	テルモ
<u>バラクルード錠 0.5mg</u>	ブリistol・マイヤーズ スクイブ
<u>ビダーザ注射用 100mg</u>	日本新薬
<u>ビレーズトリエアロスフィア 56 吸入</u>	アストラゼネカ
<u>フィルグラスチム BS 注 75 μg シリンジ 「モチダ」</u>	持田製薬
<u>フィルグラスチム BS 注 300 μg シリンジ 「モチダ」</u>	持田製薬
<u>プレセデックス静注液 200 μg 「ファイザー」</u>	ファイザー
<u>ペルマックス錠 250 μg</u>	協和キリン
<u>ポンタールカプセル 250mg</u>	ファイザー
<u>マイザークリーム 0.05%</u>	田辺三菱製薬
<u>マーロックス懸濁用配合顆粒</u>	サノフィ
<u>ミネプロ錠 2.5mg</u>	第一三共
<u>ユーロジン 2mg 錠</u>	武田薬品工業
<u>ロゼレム錠 8mg</u>	武田薬品工業
<u>ロトリガ粒状カプセル 2g</u>	武田薬品工業
<u>ロペミンカプセル 1mg</u>	ヤンセンファーマ

【院外専用採用削除医薬品】

<u>ボラザ G 坐剤</u>	天藤製薬
-----------------	------

【特定患者臨時採用削除医薬品】

<u>ストラテラカプセル 25mg</u>	日本イーライリリー
-----------------------	-----------