

< あなたの治療について >





消・外-BV/FOLFOXIRI-大腸-q2w

今回の治療は、BV/FOLFOXIRI 療法という治療法で、アバスチン（BV）、イリノテカン（CPT-11）、レボホリナート（LV）、エルプラット（L-OHP）と5FUという5種類の注射薬を併用して行います。アバスチン、イリノテカン、エルプラット、5FUは、共に腫瘍の増殖を抑えるお薬で、レボホリナートは5FUの効果を増強させるお薬です。5つの薬を組み合わせることで、より効果を高めることができます。

治療全体の流れ

今回の化学療法は2週間が1コースとなっています。各コースの1日目に点滴を行います。この治療を2週間（14日間）ごとに12回繰り返します。副作用が強く出たり、体調がすぐれない場合は回復するまで、治療を延期したり、お薬の量を減らしたりすることがあります。

1コース分の治療スケジュール

順序	薬剤商品名 (薬の作用)	投与	1日目	2~14日目
	アバスチン (抗がん剤) 5mg/kg	点滴 約90分		お休み
	グラニセトロン デキサート (吐き気止め)	点滴 約15分		
	イリノテカン (抗がん剤) 165mg/m ²	点滴 約60分		
	レボホリナート (抗がん剤) 200mg/m ²	点滴 約2時間		
	エルプラット (抗がん剤) 85mg/m ²	点滴 約2時間		
	5-FU (抗がん剤) 3200mg/m ²	点滴 約48時間		

点滴中や点滴後に、注射部位が痛い、赤くなってはれる、水ぶくれができる、ただれるなどの症状に気づいたときは、すぐに申し出てください。また点滴中は、体を動かすことにより針がずれ、点滴漏れが生ずることがありますので気をつけて下さい。

起こりやすい副作用について（頻度20%以上）

アバスチン・イリノテカン・レボホリナート・エルプラット・5-FUについて

白血球減少、好中球減少、ヘモグロビン減少・貧血、血小板減少 AST (GOT) 上昇、ALT (GPT) 上昇、ALP 上昇 悪心、嘔吐、食欲不振 下痢、腹痛 末梢神経症状 疲労 注射部位反応

特徴的な副作用について

アバスチンにおける

ショック・アナフィラキシー様症状

「顔が赤く熱くなる、皮膚が痒い、蕁麻疹がでる、唇や舌・手足がしびれる、くしゃみ・咳が出る、気分が悪い、心臓がドキドキする、尿意や便意を生じる、喉がつまる、息が苦しい、目の前が暗くなる」などの症状

*** 投与時間は初回 90 分、2 回目 60 分、3 回目以降 30 分と短縮することがあります。**

創傷治癒遅延

手術後の傷口の治りが遅れる

*** 手術の後、手術を行う場合は医師に確認してください。**

高血圧

高血圧になることがありますので、治療期間中は定期的に血圧を測定することが大切です

脳出血

「鼻血、歯ぐきからの出血；青あざができる；痰に血が混じる；吐き気、嘔吐；頭痛、突然のひどい頭痛；顔や手足の片側がしびれる」などの症状

イリノテカンにおける

過敏症状

呼吸困難、血圧低下等

下痢

*** 排便回数の増加、水様便又は腹痛を伴うような場合は、医師・看護師・薬剤師にご相談下さい。**

腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞、腸炎

激しい下痢、腹痛、下血、頑固な便秘など

間質性肺炎

「息切れがする、息苦しくなる；から咳が出る、発熱」などの症状

エルプラットにおける

末梢神経症状、咽頭喉頭感覚異常

手、足、口、のどのまわりのしびれ、痛み、のどがしめつけられるような感覚

*** 上記症状は、低温又は冷たいものへの曝露により誘発又は悪化することが知られています。冷たい飲み物や氷の使用を避け、低温時には皮膚を露出しないよう注意して下さい。**

過敏症状

発疹、かゆみ、気管支痙攣、呼吸困難、血圧低下など

5FU における

激しい下痢

重篤な腸炎

「水のような下痢；2~3 日続く下痢；腹痛；トマトジュース様の下痢」などの症状


*** 上記症状が現れたときは、必ず医師・看護師・薬剤師にご相談下さい。**

副作用の発現時期の目安

*この図は、今回用いられている抗癌剤による副作用だけでなく、他の抗癌剤によって起こる副作用も含まれています。

これらの副作用がすべてあらわれるわけではありません。

また、発現する時期や程度も抗癌剤の種類や患者さんの体質により個人差があります。



副作用の対策について

吐き気・嘔吐、下痢と便秘、口内炎、感染症、出血、貧血、脱毛などの副作用の対策について知りたい方は、資料をお渡しすることができますのでお申し出下さい。

**薬品毎の副作用について(添付文書における重大な副作用を製薬会社作成「薬のしおり」などから抜粋)
まれな副作用ですが、この様な症状が現れた際には医師・薬剤師・看護師へご相談下さい。**

【アバスチン】

- <消化管穿孔>激しい腹痛、吐き気、おう吐、便秘、便に血が混じる(赤～黒っぽい便が出る)
- <創傷治癒遅延>傷口が治りにくい、傷口が開く、傷口から出血する
- <消化管出血>激しい腹痛、血を吐く、便に血が混じる(赤～黒っぽい便が出る)
- <肺出血>痰に血が混じる、血を吐く
- <脳出血>頭痛、吐き気、おう吐、片側の手足のまひ、強いしびれ、意識がもうろうとする
- <脳血管発作、一過性脳虚血発作、脳虚血、脳梗塞>頭が重い、頭痛、吐き気、おう吐、しゃべりにくくなる、顔や手足のまひ、しびれ、めまい、意識がもうろうとする、視力が低下する
- <心筋梗塞、狭心症>胸が痛い、胸が苦しい
- <高血圧性脳症、高血圧性クリーゼ>頭痛、吐き気、意識がもうろうとする、けいれん
- <可逆性後白質脳症候群>頭痛、ぼんやりする、ふらつき、覚えられない、物忘れ、けいれん、しゃべりにくい、見えにくい、眼のかすみ、明暗がわからない、意識がなくなる
- <ショック、アナフィラキシー様症状>寒気がする、冷汗が出る、手足がしびれる、立ちくらみ、呼吸困難、胸が苦しい、発疹、じんましん、かゆみ、むくみ、口唇やのどがはれる、血圧が下がる
- <粘膜出血>鼻血が出る、歯ぐきから出血する、膣から出血する
- <深部静脈血栓症、肺塞栓症等の静脈血栓塞栓症>片方のふくらはぎが赤く腫れたり、ふくらはぎを押すと痛む、急に息苦しく感じたり、胸苦しさを感ずる
- <ネフローゼ症候群>尿の量が減る、体がだるい、疲れやすい、尿が出にくい
- <好中球減少症>熱が出る、体がだるい、のどが痛いなどのかぜのような症状
- <うつ血性心不全>息切れがする、胸が痛い、胸が苦しい

【イリノテカン】

- <骨髄機能抑制> いつもより体がだるく熱っぽい、皮下出血がある。

<重症感染症(敗血症、肺炎等)> 寒気がする。ふるえを伴う急激な高熱がでる。脈拍数が増加する。筋肉痛がある。関節が痛い。血圧が下がる。咳や痰が出る。息切れがする。

<DIC(播種性血管内凝固症候群)> 階段や坂を上る時に心臓がドキドキする。息切れがする。身体がだるくなる。鼻血、歯ぐきの出血、皮下出血など、出血しやすくなる。

<感染症> 寒気がする。熱がある。だるい。

<下痢・腸炎> 泥状または水様の便が続く。突然、下痢になったり、吐き気、おなかが痛くなる。また、長期的に下痢や便秘異常が続いたり、便に粘液が混ざることがある。

<腸管麻痺・腸閉塞> おなかが張って痛み、吐き気がする。便が出なくなったり、おならが止まる。

<消化管出血> 暗赤色・鮮血色の血液が便の表面に付着する。イチゴゼリー状の便、黒色便、タール便がでる。

<腸管穿孔> 激しい腹痛が始まり痛みが持続する。

<過敏症> 発しんやかゆみなどがでる。熱感があって、だるい。気分が悪い。

<ショック> 下痢や吐いた後、顔が青ざめる。冷汗がでる。立ちくらみやめまいがする。息切れがする。意識がなくなる。

<アナフィラキシー様症状> 口の中に違和感を感じる。唇がしびれる。息苦しくなる。蕁麻疹(じんましん)やかゆみがある。眼や唇のまわりが腫れる。意識障害がある。心臓がドキドキする。息切れがする。身体がだるくなる。頬などが赤らむ。

<肝機能障害> 身体がだるくなり、吐き気がする。尿の色が濃くなる。白目や皮膚が黄色くなる。

<急性腎不全> 尿量が少ない。食欲がでない。身体がだるい。むくむ。

<間質性肺炎・肺線維症> から咳がでる。息苦しい。息切れがする。

<肺塞栓症> 突然、息が苦しくなり、胸骨(胸の中央の骨)の下に不快感を覚える。脈が速くなる。

<静脈血栓症> 下半身で血液がうっ滞をおこしたところが腫れたり、口唇や頬が青紫色になる。歩行により痛みが増す。

<心筋梗塞> 突然、胸が締めつけられたり、焼けるような痛みが強く、長く続く。

<狭心症発作> 急に胸が締めつけられたり、押さえつけられたり、詰まったような痛みがおこる。胸だけでなく、みぞおち付近や左腕、肩まで痛みがひびくことがある。

<心室性期外収縮> 瞬間的に心臓がドキッとしたり、脈が抜けたような感じや息が詰まる感じがする。

【レボホリナート】

<下痢> 激しい下痢、脱水症状

<腸炎> 出血性腸炎、虚血性腸炎、壊死性腸炎、激しい腹痛、下痢

<白血球減少> 発熱、寒く感じる・ふるえ、喉の痛み

<貧血> 疲れやすい、めまい、頭がふらふらする、皮膚や顔が青白い

<血小板減少> 原因不明のあざ、歯茎からの出血、鼻血、月経量の増加、血がとまりにくい

<ショック、アナフィラキシー様症状> 発疹、蕁麻疹、頻脈、せいでいする

<白質脳症、精神・神経障害> 歩行時のふらつき、四肢末端のしびれ感、舌のもつれ

<心不全、心筋梗塞、狭心症> 手や足首のむくみ、息切れ、動悸、胸の痛み

<肝機能障害、黄疸> AST、ALT、ALP、 γ -GTP 上昇、黄疸

<急性腎不全> 頭痛、尿量の減少、手や足首のむくみ、わき腹の痛み

<間質性肺炎> 発熱、空咳、息切れ、呼吸困難

<消化管潰瘍> 消化管潰瘍

<口内炎> 重篤な口内炎

<手足症候群> 手掌、足の紅斑、疼痛性発赤腫脹、知覚過敏

<播種性血管内凝固症候群(DIC)> 循環不全による腎機能低下、呼吸不全など、凝固因子・血小板減少や線溶活性化による出血症状(粘膜炎、止血不良、脳出血など)

<嗅覚障害> おいけわからぬ・しない

<高アンモニア血症> 眠気、呼びかけに対する反応が悪い、けいれん

<急性膵炎> 上腹部の痛み、吐き気、嘔吐

【エルプラット】

<ショック・アナフィラキシー様反応> 顔面がそう白になる。胸が苦しい。意識が混濁する。

<過敏症> 発しんやかゆみがある。息が苦しい。めまいがする。

<末梢神経症候群> 持続的に手や足、口のまわりがしびれたり、痛む。のどがしめつけられるような感覚が続く。

<間質性肺炎・肺線維症>から咳がでる。軽い動作や運動時の息切れ。熱がでる。胸が苦しい。
<骨髄機能抑制>寒気がする。発熱。のどの痛み。貧血。めまい。息切れ。出血しやすい。
<溶血性尿毒症症候群>発熱。貧血症状。皮下出血によるあざ。しびれ。むくみ。頭痛。
<視野欠損・視野障害・視神経炎・視力低下>目がかすむ。物の形が見えにくい。
<血栓塞栓症>鋭い胸の痛みがある。足の付け根や足に痛みがある。わきの下や腕に痛みがある。
<心室性不整脈・心筋梗塞>どうき。胸が痛い。めまいがする。ふらふらする。
<肝静脈閉塞症>血を吐く。便が黒い。

【5-FU】

<脱水症状(激しい下痢)>発熱、激しい腹痛、下痢、水様便、血便
<腸炎>発熱、激しい腹痛、下痢、水様便、血便
<白血球減少>発熱、寒く感じる、ふるえ、喉の痛み
<貧血>疲れやすい、めまい、頭がふらふらする、皮膚や顔が青白い
<血小板減少>原因不明のあざ、歯茎からの出血、鼻血、月経量の増加、血がとまりにくい
<ショック、アナフィラキシー様症状>発疹、蕁麻疹、頻脈、せいでいする
<白質脳症>歩行時のふらつき、手足のしびれ、舌のもつれ
<うっ血性心不全、心筋梗塞、安静狭心症>手や足首のむくみ、息切れ、動悸、胸の痛み
<急性腎不全>尿量の変化、手や足首のむくみ
<間質性肺炎>発熱、空咳、息切れ、呼吸困難
<肝機能障害、黄疸、肝不全>倦怠感、食欲不振、右側腹部痛、眠け、皮膚が黄色くなる、白目が黄色味を帯びる
<消化管潰瘍>胸やけ、消化不良、腹部のさしこみ痛、タール状の便
<激しい口内炎>口内のただれ・痛み・出血
<急性膀胱炎>吐き気、嘔吐、背部痛、上腹部の激痛
<意識障害を伴う高アンモニア血症>眠気、呼びかけに対する反応が悪い、けいれん
<手足症候群>手のひらや足の裏の腫れ・痛み、皮がむける
<味覚障害・脱失>においがわからない・しない

上記のほかにも副作用が現れることがあります。

他にもからだの異常を感じたら、主治医や薬剤師、看護師に相談してください。