

< あなたの治療について >


消・外-BV/TS-1-大腸-q6w




今回の治療は、BV/TS-1 療法という治療法で、ティーエスワン（TS1）という内服薬とアバスチン（BV）という注射薬を併用して行います。ティーエスワンとアバスチンは、共に腫瘍の増殖を抑えるお薬です。2つの薬を組み合わせることで、より効果を高めることができます。

治療全体の流れ

今回の化学療法は6週間が1コースとなっています。各コースの1日目と15日目と29日目に点滴を行い、1日目の点滴の日から28日間に渡って内服薬を服用します。この治療を6週間(42日間)ごとに繰り返します。副作用が強く出たり、体調がすぐれない場合は回復するまで、治療を延期したり、お薬の量を減らしたりすることがあります。

1コース分の治療スケジュール

薬剤商品名 (薬の作用)	投与	1~28日目	29~42日目
ティーエスワン (抗がん剤) 80mg/m ² /日	内服		お休み

順序	薬剤商品名 (薬の作用)	投与	1日目	2~14日目	15日目	16~28日目	29日目	30~42日目
	アバスチン (抗がん剤) 5mg/kg	点滴 約90分		お休み		お休み		お休み

点滴中や点滴後に、注射部位が痛い、赤くなつてはれる、水ぶくれができる、ただれるなどの症状に気づいたときは、すぐに申し出てください。また点滴中は、腕を動かすことにより針がずれ、点滴漏れが生ずることがありますので気をつけて下さい。

起こりやすい副作用について(頻度20%以上)

ティーエスワン、アバスチンについて

白血球減少、好中球減少、ヘモグロビン減少 食欲不振、悪心 全身倦怠感 色素沈着

特徴的な副作用について

ティーエスワンにおける

間質性肺炎

「息切れがする，息苦しくなる；から咳が出る，発熱」などの症状

アバスチンにおける

ショック・アナフィラキシー様症状

「顔が赤く熱くなる，皮膚が痒い，蕁麻疹がでる，唇や舌・手足がしびれる，くしゃみ・咳が出る，気分が悪い，心臓がドキドキする，尿意や便意を生じる，喉がつまる，息が苦しい，目の前が暗くなる」などの症状

*** 投与時間は初回 90 分、2 回目 60 分、3 回目以降 30 分と短縮することがあります。**

創傷治癒遅延

手術後の傷口の治りが遅れる

*** 手術の後、手術を行う場合は医師に確認してください。**

高血圧

高血圧になることがありますので、治療期間中は定期的に血圧を測定することが大切です

脳出血

「鼻血，歯ぐきからの出血；青あざができる；痰に血が混じる；吐き気，嘔吐；頭痛，突然のひどい頭痛；顔や手足の片側がしびれる」などの症状


*** 上記症状が現れたときは、必ず医師・看護師・薬剤師にご相談下さい。**

副作用の発現時期の目安

*この図は、今回用いられている抗癌剤による副作用だけでなく、他の抗癌剤によって起こる副作用も含まれています。

これらの副作用がすべてあらわれるわけではありません。

また、発現する時期や程度も抗癌剤の種類や患者さんの体質により個人差があります。



副作用の対策について

吐き気・嘔吐，下痢と便秘，口内炎，感染症，出血，貧血，脱毛などの副作用の対策について知りたい方は、資料をお渡しすることができますのでお申し出下さい。

薬品毎の副作用について（添付文書における重大な副作用を製薬会社作成「薬のしおり」などから抜粋）
まれな副作用ですが、この様な症状が現れた際には医師・薬剤師・看護師へご相談下さい。

【TS-1】

- <骨髄抑制>出血がとまりにくい、体がだるい、発熱、のどの痛み
- <重篤な肝障害>皮膚が黄色くなる、体がだるい、白目が黄色くなる、食欲不振
- <重篤な腸炎>下痢、激しい腹痛
- <間質性肺炎>息苦しい、発熱、空咳
- <消化管出血>血が混じった便、黒色便、血を吐く、腹痛
- <皮膚粘膜剥脱症候群>ひどい口内炎、赤い発疹、まぶたや眼の充血

【アバステン】

- <消化管穿孔>激しい腹痛、吐き気、おう吐、便秘、便に血が混じる（赤～黒っぽい便が出る）
- <創傷治癒遅延>傷口が治りにくい、傷口が開く、傷口から出血する
- <消化管出血>激しい腹痛、血を吐く、便に血が混じる（赤～黒っぽい便が出る）
- <肺出血>痰に血が混じる、血を吐く
- <脳出血>頭痛、吐き気、おう吐、片側の手足のまひ、強いしびれ、意識がもうろうとする
- <脳血管発作、一過性脳虚血発作、脳虚血、脳梗塞>頭が重い、頭痛、吐き気、おう吐、しゃべりにくくなる、顔や手足のまひ、しびれ、めまい、意識がもうろうとする、視力が低下する
- <心筋梗塞、狭心症>胸が痛い、胸が苦しい
- <高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ>頭痛、吐き気、意識がもうろうとする、けいれん
- <可逆性後白質脳症候群>頭痛、ぼんやりする、ふらつき、覚えられない、物忘れ、けいれん、しゃべりにくい、見えにくい、眼のかすみ、明暗がわからない、意識がなくなる
- <ショック、アナフィラキシー様症状>寒気がする、冷汗が出る、手足がしびれる、立ちくらみ、呼吸困難、胸が苦しい、発疹、じんましん、かゆみ、むくみ、口唇やのどがはれる、血圧が下がる
- <粘膜出血>鼻血が出る、歯ぐきから出血する、膣から出血する
- <深部静脈血栓症、肺塞栓症等の静脈血栓塞栓症>片方のふくらはぎが赤く腫れたり、ふくらはぎを押すと痛む、急に息苦しく感じたり、胸苦しさを感ずる
- <ネフローゼ症候群>尿の量が減る、体がだるい、疲れやすい、尿が出にくい
- <好中球減少症>熱が出る、体がだるい、のどが痛いなどのかぜのような症状
- <うっ血性心不全>息切れがする、胸が痛い、胸が苦しい

上記のほかにも副作用が現れることがあります。

他にもからだの異常を感じたら、主治医や薬剤師、看護師に相談してください。