

< あなたの治療について >

消・外 - Cnab/Encora/Binime - 大腸 - weekly

今回の治療は、Cnab/Encora/Binime という治療法で、アービタックス（Cnab）という注射薬とピラフトビとメクトビという内服薬を併用して治療を行います。アービタックス、ピラフトビ、メクトビは、共に腫瘍の増殖を抑えるお薬です。3つの薬を組み合わせることで、より効果を高めることができます。

◎ 治療全体の流れ

今回の化学療法は1週間が1コースとなっています。各コースの1日目に点滴を行い、1日目の点滴の日から7日間に渡って内服薬を服用します。この治療を1週間（7日間）ごとに繰り返します。副作用が強く出たり、体調がすぐれない場合は回復するまで、治療を延期したり、お薬の量を減らしたりすることがあります。

◎ 1コース分の治療スケジュール

	薬剤商品名 (薬の作用)	投与	1~7日目
	ピラフトビ (抗がん剤) 300mg/日	内服	
	メクトビ (抗がん剤) 90mg/日	内服	

順序	薬剤商品名 (薬の作用)	投与	1日目	2~7日目
①	レスタミン (アレルギーを抑える薬)	内服		<b>お休み</b>
②	デキサート (アレルギー予防・ 吐き気止め)	点滴 約15分		
③	アービタックス (抗がん剤) 初回 400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降 250mg/m <sup>2</sup>	点滴 初回約2時間 2回目からは 約1時間		
④	生理食塩液 (電解質)	点滴 初回約1時間 2回目からは 約15分		

★ 点滴中や点滴後に、注射部位が痛い、赤くなってはれる、水ぶくれができる、ただれるなどの症状に気づいたときは、すぐに申し出てください。また点滴中は、腕を動かすことにより針がずれ、点滴漏れが生ずることがありますので気をつけて下さい。

## ◎起こりやすい副作用について（頻度 20%以上）

ビラフトビ、メクトビ、アービタックスによる

- 悪心・嘔吐 ●下痢 ●口内炎 ●疲労 ●ざ瘡/ざ瘡様皮膚炎 ●発疹（湿疹、丘疹等）、皮膚乾燥、そう痒症

## ◎特徴的な副作用について

ビラフトビ、メクトビにおける

### ●眼障害

「小さいゴミのようなものがみえる症状の悪化、視界の中に閃光のような光がみえる、視界にカーテンのような黒幕がみえる、物がゆがんで見える、視界の中に見づらい部分がある、目のかすみ、視力の低下、視界にごみや虫のようなものが飛んでいるように見える、まぶしい、目の痛み、目の充血」などの症状

### ●心機能障害

「息苦しい、息切れ、疲れやすい、むくみ、体重の増加」などの症状

### ●肝機能障害

「疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振」などの症状

### ●横紋筋融解症

「手足のこわばり、手足のしびれ、脱力感、筋肉の痛み、尿が赤褐色になる」などの症状

### ●高血圧、高血圧クリーゼ

「頭痛、肩こり、めまい、動悸、息切れ、顔のほてり、体がだるい、目のかすみ、意識の低下、意識の消失、吐き気、鼻出血」などの症状がでることがありますので、治療期間中は定期的に血圧を測定することが大切です。

アービタックスにおける

### ●インフュージョンリアクション

「気管支痙攣、蕁麻疹、低血圧、意識消失、ショック」などの症状

### ●ざ瘡/ざ瘡様皮膚炎、発疹、皮膚乾燥、そう痒症

\* ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、そう痒症、爪囲炎などの皮膚障害については、別添の資料を参照して下さい。


\* 上記症状が現れたときは、必ず医師・看護師・薬剤師にご相談下さい。

## ◎副作用の発現時期の目安

\* この図は、今回用いられている抗癌剤による副作用だけでなく、他の抗癌剤によって起こる副作用も含まれています。

これらの副作用がすべてあらわれるわけではありません。

また、発現する時期や程度も抗癌剤の種類や患者さんの体質により個人差があります。



## ◎副作用の対策について

★吐き気・嘔吐、下痢と便秘、口内炎、感染症、出血、貧血、脱毛などの副作用の対策について知りたい方は、資料をお渡しすることができますのでお申し出下さい。

## ◎薬品毎の副作用について（添付文書における重大な副作用を製薬会社作成「薬のしおり」などから抜粋）

まれな副作用ですが、このような症状が現れた際には医師・薬剤師・看護師へご相談下さい。

### 【ピラフトビ】

[皮膚悪性腫瘍]急に「いぼ」ができて大きくなる、皮膚の表面がけだれたりじゅくじゅくしたりする

[眼障害]視力低下、目のかすみ

[心機能障害]動悸、息切れ、むくみ

[肝機能障害]全身けん怠感、食欲不振、吐き気、黄疸

[横紋筋融解症]手足の筋肉の痛み、こわばり、しびれ、脱力感、赤褐色尿

[高血圧、高血圧クリーゼ]頭痛、頭重（頭が重い）、めまい、肩こり、動悸

[出血]血便、血尿、歯ぐきからの出血

[手掌・足底発赤知覚不全症候群]手や足のしびれ、感覚異常、赤くはれぼったくなる

### 【メクトビ】

[眼障害]視力低下、目のかすみ

[心機能障害]動悸、息切れ、むくみ

[肝機能障害]全身けん怠感、食欲不振、吐き気、黄疸

[横紋筋融解症]手足の筋肉の痛み、こわばり、しびれ、脱力感、赤褐色尿

[高血圧、高血圧クリーゼ]頭痛、頭重（頭が重い）、めまい、肩こり、動悸

[出血]血便、血尿、歯ぐきからの出血

### 【アービタックス】

[重度のインフュージョン・リアクション（薬剤注入に伴う反応）]急に呼吸が困難になる、蕁麻疹、血圧低下、意識消失などのアナフィラキシー症状

[重度の皮膚症状]にきびのような発疹、皮膚の乾燥・炎症など

[間質性肺疾患]咳、息切れ、発熱、全身けん怠感（だるさ）

[心不全]胸が痛い、胸が苦しい（狭心症、心筋梗塞などの症状）

[低マグネシウム血症]痙攣、しびれ、全身けん怠感（だるさ）

[重度の下痢]腹痛、激しい下痢、脱水

[血栓塞栓症]息苦しい、胸が苦しい、ふくらはぎを押すと痛む

[感染症]肺炎、敗血症などの症状

## ◎ 上記のほかにも副作用が現れることがあります。

他にもからだの異常を感じたら、主治医や薬剤師、看護師に相談してください。