

< あなたの治療について >




婦人科-CBDCA/PLD-卵巣-q4w

今回の治療は、CBDCA/PLD という治療法で、カルボプラチン ( CBDCA ) とドキシル ( PLD ) という2種類の注射薬を併用して行います。カルボプラチンとドキシルは共に腫瘍の増殖を抑えるお薬です。2つの薬を組み合わせることで、より効果を高めることができます。

治療全体の流れ

今回の化学療法は4週間が1コースとなっています。各コースの1日目に点滴を行います。この治療を4週間( 28日間 )ごとに繰り返します。副作用が強く出たり、体調がすぐれない場合は回復するまで、治療を延期したり、お薬の量を減らしたりすることがあります。

1コース分の治療スケジュール

順序	薬剤商品名 (薬の作用)	投与	1日目	2~28日目
	グラニセトロン デキサート (吐き気止め)	点滴 約15分		お休み
	ドキシル (抗がん剤) 30mg/m <sup>2</sup>	点滴 約1時間		
	カルボプラチン (抗がん剤) 5AUC	点滴 約1時間		

点滴中や点滴後に、注射部位が痛い、赤くなつてはれる、水ぶくれができる、ただれるなどの症状に気づいたときは、すぐに申し出てください。また点滴中は、腕を動かすことにより針がずれ、点滴漏れが生ずることがありますので気をつけて下さい。

起こりやすい副作用について ( 頻度 20%以上 )

カルボプラチン・ドキシルについて

白血球減少・好中球減少・リンパ球減少・赤血球減少・ヘモグロビン減少・ヘマトクリット値減少、血小板減少

悪心・嘔吐、食欲不振 手足症候群 口内炎 血中LDH増加・血中アルブミン減少 発疹  
疲労 体重減少

特徴的な副作用について

ドキシルにおける

心筋障害

「息切れがする、咳き込む、急に胸が痛む、脈が乱れる、めまいがする」などの症状

infusion reaction

「ほてり、潮紅、胸部不快感、呼吸困難、悪心、熱感、背部痛、頻脈、そう痒症、鼻漏、腹痛、動悸、血圧上昇、顔面腫脹、頭痛、悪寒、胸痛、胸部及び咽喉の絞扼感、発熱、発疹、チアノーゼ、失神、気管支痙攣、喘息、無呼吸、低血圧、息切れ」などの症状

\* infusion reactionの発現の危険性を最小限にするため投与速度は1mg/分を超えないようゆっくり点滴します。

## 肝機能障害

「発熱(38~39), ぶつぶつ様の発疹, 食欲がなくなる, 気分が悪くなる, 下痢になる, したいに強くなる 全身のだるさ, 皮膚や白目が黄色くなる, 体がかゆい」などの症状


\* 上記症状が現れたときは、必ず医師・看護師・薬剤師にご相談下さい。

## 副作用の発現時期の目安

\*この図は、今回用いられている抗癌剤による副作用だけでなく、他の抗癌剤によって起こる副作用も含まれています。

これらの副作用がすべてあらわれるわけではありません。

また、発現する時期や程度も抗癌剤の種類や患者さんの体質により個人差があります。



## 副作用の対策について

吐き気・嘔吐, 下痢と便秘, 口内炎, 感染症, 出血, 貧血, 脱毛などの副作用の対策について知りたい方は、資料をお渡しすることができますのでお申し出下さい。

薬品毎の副作用について(添付文書における重大な副作用を製薬会社作成「薬のしおり」などから抜粋)

まれな副作用ですが、この様な症状が現れた際には医師・薬剤師・看護師へご相談下さい。

## 【ドキシル】

<心筋障害>息切れがする、せき込む、急に胸が痛む、脈が乱れる、めまいがする

<骨髄抑制>発熱、寒気がする、のどが痛む;口の中に白い斑点ができる;手足に赤い点(点状出血)または赤いあざ(紫斑)ができる、出血しやすい(歯ぐきの出血・鼻血など);水のような下痢、腹痛;口内炎;通常の生活をしていてだるさが続く、ちょっとした階段や坂で動悸や息切れを感じる、顔色が悪いといわれる

<infusion reaction>ほてり、潮熱、胸部不快感、呼吸困難、悪心、熱感、背部痛、頻脈、掻痒症、鼻漏、腹痛、動悸、血圧上昇、顔面腫脹、頭痛、悪寒、胸痛、胸部及び咽喉の絞扼感、発熱、発疹、チアノーゼ、失神、気管支痙攣、喘息、無呼吸、低血圧、息切れなどの症状

<手足症候群>腫脹、疼痛、紅斑、手足の皮膚の落屑を特徴とする手掌・足底の皮疹

<口内炎>熱い食物、冷たいもの、オレンジジュースなどがしみる、口の中があれで痛い

<肝機能障害>発熱(38~39), ぶつぶつ様の発疹, 食欲がなくなる, 気分が悪くなる, 下痢になる, したいに強くなる全身のだるさ, 皮膚や白目が黄色くなる, 体がかゆい

<間質性肺疾患>息切れがする、息苦しくなる;から咳が出る、発熱

<肺塞栓症>突然、息が苦しくなり、胸骨（胸の中央の骨）の下に不快感を覚える。脈が速くなる。

<深部静脈血栓症>片方のふくらはぎが赤く腫れたり、ふくらはぎを押すと痛む、急に息苦しく感じたり、胸苦しさを感

## 【カルボプラチン】

<汎血球減少等の骨髄抑制> 発熱、悪寒、咳、鼻水が出る、めまい、出血しやすい、血が止まりにくい、あざができる、体がだるい、疲れやすい、息切れ、のどの痛み

<ショック・アナフィラキシー様症状> 唇や爪などが青紫色になる、胸や息が苦しくなる、急に気分が悪くなる、めまいがする

<間質性肺炎> 発熱、咳、胸や息が苦しくなる

<急性腎不全> 尿の出が悪くなる、血尿が出る

<肝不全、肝機能障害、黄疸> 黄疸が出る

<消化管壊死、消化管穿孔、消化管出血、消化管痙攣> 激しい腹痛、下血

<脳梗塞、肺梗塞> 意識の低下、手足のしびれ、息苦しい

<血栓・塞栓症> 手足のしびれ、息苦しい

<心筋梗塞、うっ血性心不全> 動悸、息切れ、胸が痛い、苦しい

<溶血性尿毒症症候群> 出血しやすい、血が止まりにくい、尿の出が悪くなる、皮膚や白目が黄色くなる、めまいがする、皮膚に紫色の斑点ができる

<急性呼吸窮乏症候群> 急に呼吸が困難になる

<播種性血管内凝固症候群> 出血しやすい、血が止まりにくい

<急性膵炎> 上腹部の激痛

<出血性腸炎、偽膜性大腸炎> 激しい腹痛、下痢

<麻痺性イレウス> 食欲不振、悪心・嘔吐、著しい便秘、腹痛、腹部の膨満、腸内容物のうっ滞

**上記のほかにも副作用が現れることがあります。**

**他にもからだの異常を感じたら、主治医や薬剤師、看護師に相談してください。**