

< あなたの治療について >






婦人科-CBDCA/PLD/BV-卵巣-q4w

今回の治療は、CBDCA/PLD/ BV という治療法で、カルボプラチン（CBDCA）とドキシル（PLD）とベバシズマブ（BV）という3種類の注射薬を併用して行います。カルボプラチンとドキシルとベバシズマブは共に腫瘍の増殖を抑えるお薬です。3つの薬を組み合わせることで、より効果を高めることができます。

◎ 治療全体の流れ

今回の化学療法は4週間が1コースとなっています。各コースの1日目に点滴を行います。この治療を4週間（28日間）ごとに6回繰り返します。副作用が強く出たり、体調がすぐれない場合は回復するまで、治療を延期したり、お薬の量を減らしたりすることがあります。

◎ 1コース分の治療スケジュール

順序	薬剤商品名 (薬の作用)	投与	1日目	2~14日目	15日目	16~28日目
①	グラニセトロン デキサート (吐き気止め)	点滴 約15分		お休み	お休み	お休み
②	ドキシル (抗がん剤) 30mg/m <sup>2</sup>	点滴 約60分				
③	カルボプラチン (抗がん剤) AUC5	点滴 約60分				
④	ベバシズマブ (抗がん剤) 10mg/kg	点滴 初回90分 2回目60分 3回目以降30分				

★ 点滴中や点滴後に、注射部位が痛い、赤くなつてはれる、水ぶくれができる、ただれるなどの症状に気づいたときは、すぐに申し出てください。また点滴中は、腕を動かすことにより針がずれ、点滴漏れが生ずることがありますので気をつけて下さい。

◎起りやすい副作用について（頻度20%以上）

ドキシル・カルボプラチン・ベバシズマブによる

- 白血球数減少、好中球数減少、リンパ球数減少、ヘモグロビン減少、赤血球数減少、血小板数減少、ヘマトクリット値減少 ●ALT 増加、AST 増加、血中LDH 増加、γ-GTP 増加、血中AL-P 増加 ●血中尿素増加
- 総蛋白減少、血中アルブミン減少、血中クレアチニンホスホキナーゼ減少、血中ナトリウム減少
- 悪心・嘔気・嘔吐、食欲不振 ●口内炎 ●便秘・下痢 ●手足症候群 ●発疹 ●疲労
- 体重減少 ●脱毛症

## ◎特徴的な副作用について

### ドキシルにおける

#### ●心毒性

「息苦しい、息切れ、疲れやすい、むくみ、体重の増加」などの症状

#### ●インフュージョンリアクション

「ほてり、潮紅、胸部不快感、呼吸困難、悪心、熱感、背部痛、頻脈、そう痒症、鼻漏、腹痛、動悸、血圧上昇、顔面腫脹、頭痛、悪寒、胸痛、胸部及び咽頭の絞扼感、発熱、発疹、チアノーゼ、失神、気管支痙攣、喘息、無呼吸、低血圧、息切れ」などの症状

#### ●肝機能障害

「発熱（38～39℃）、ぶつぶつ様の発疹、食欲がなくなる、気分が悪くなる、下痢になる、しだいに強くなる全身のだるさ、皮膚や白目が黄色くなる、体がかゆい」などの症状

### ベバシズマブにおける

#### ●創傷治癒遅延

「傷が治りにくい」などの症状

#### ●高血圧

#### ●血栓性微小血管症

「血が出やすくなる、鼻血、歯茎の出血、あおあざができる、血尿」などの症状


**\* 上記症状が現れたときは、必ず医師・看護師・薬剤師にご相談下さい。**

## ◎副作用の発現時期の目安

\*この図は、今回用いられている抗癌剤による副作用だけでなく、他の抗癌剤によって起こる副作用も含まれています。

これらの副作用がすべてあらわれるわけではありません。

また、発現する時期や程度も抗がん剤の種類や患者さんの体質により個人差があります。



## ◎副作用の対策について

★吐き気・嘔吐、下痢と便秘、口内炎、感染症、出血、貧血、脱毛などの副作用の対策について知りたい方は、資料をお渡しすることができますのでお申し出下さい。

## ◎薬品毎の副作用について（添付文書における重大な副作用を製薬会社作成「薬のしおり」などから抜粋）

まれな副作用ですが、この様な症状が現れた際には医師・薬剤師・看護師へご相談下さい。

### 【ドキシル】

- [心筋障害] 動悸・息切れ、胸が痛い、足のむくみ
- [骨髄抑制] 発熱、寒気、出血しやすい
- [インフュージョンリアクション] ほてり、顔のはれ、寒気
- [手足症候群] 手足の腫れ、皮膚が赤くなる、手のひらや足の裏の痛みや発疹
- [間質性肺疾患] 発熱、から咳、呼吸困難
- [肺塞栓症] 呼吸困難、胸痛、意識障害

### 【カルボプラチン】

- [汎血球減少などの骨髄抑制] 発熱、悪寒、咳、鼻水が出る、めまい、出血しやすい、血が止まりにくい、あざができる、体がだるい、疲れやすい、息切れ、のどの痛み
- [ショック・アナフィラキシー] 唇や爪などが青紫色になる、胸や息が苦しくなる、急に気分が悪くなる、めまいがする
- [間質性肺炎] 発熱、咳、胸や息が苦しくなる
- [急性腎障害] 尿の出が悪くなる、血尿が出る
- [肝不全、肝機能障害、黄疸] 黄疸が出る
- [消化管壊死、消化管穿孔、消化管出血、消化管潰瘍] 激しい腹痛、下血
- [出血性腸炎、偽膜性大腸炎] 激しい腹痛、下痢
- [麻痺性イレウス] 食欲不振、悪心・嘔吐、著しい便秘、腹痛、腹部の膨満、腸内容物のうっ滞
- [脳梗塞、肺梗塞] 意識の低下、手足のしびれ、息苦しい
- [血栓・塞栓症] 手足のしびれ、息苦しい
- [心筋梗塞、うっ血性心不全] 動悸、息切れ、胸が痛い、苦しい
- [溶血性尿毒症症候群] 出血しやすい、血が止まりにくい、尿の出が悪くなる、皮膚や白目が黄色くなる、めまいがする、皮膚に紫色の斑点ができる
- [急性呼吸窮迫症候群] 急に呼吸が困難になる
- [播種性血管内凝固症候群] 出血しやすい、血が止まりにくい
- [急性膵炎] 上腹部の激痛
- [難聴] 耳が聞こえにくい
- [白質脳症（可逆性後白質脳症症候群を含む）] 歩行時のふらつき、口のもつれ、物忘れ、動作緩慢
- [腫瘍崩壊症候群] 尿量が減る

### 【ペバシズマブ】

- [ショック、アナフィラキシー] 冷や汗が出る、めまい、顔面そう白、手足が冷たくなる、意識の消失、かゆみ、じんましん、ふらつき、動悸、息苦しい
- [消化管穿孔、瘻孔（消化管瘻、気管支胸膜瘻、泌尿生殖器瘻、胆管瘻等）] 吐き気、おう吐、息苦しい、咳、寒気、発熱、ふらつき、息切れ、意識の低下、腹痛、お腹の皮膚が赤く腫れて膿や腸液が出てくる、肛門の周辺や皮膚に穴があき腸液や便がもれる、膣から便や尿がもれる、膣から出血する、体がだるい、食欲不振、白目や皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる、尿に泡が混じる、尿がにごっている
- [創傷治癒遅延] 傷が治りにくい
- [消化管出血] 吐き気、おう吐、吐いた物に血が混じる（赤色～茶褐色または黒褐色）、腹痛、便に血が混じる、黒い便が出る
- [肺出血] 咳と一緒に血が出る
- [脳出血] 突然の意識の低下・意識の消失・頭痛・おう吐・めまい、突然片側の手足が動かしにくくなる・しゃべりにくくなる・言葉が出にくくなる
- [粘膜出血（鼻出血、歯肉出血、膣出血等）] 血を吐く、鼻・歯ぐき・膣など粘膜からの出血、便に血が混じる
- [脳血管発作、一過性脳虚血発作、心筋梗塞、狭心症、脳虚血、脳梗塞等の動脈血栓塞栓症] 突然の意識の低下・意識の消失・頭痛・おう吐・めまい、突然片側の手足が動かしにくくなる・感覚障害がおこる・しゃべりにくくなる・言葉が出にくくなる・ろれつがまわらなくなる・視力障害がおこる・飲み込みにくくなる、しめ付けられるような胸の痛み、息苦しい、冷汗が出る、胸を強く押さえつけられた感じ、あご・左腕の痛み

[深部静脈血栓症、肺塞栓症等の静脈血栓塞栓症]発熱、皮膚・手足の爪が青紫～暗紫色になる、唇が青紫色になる、下肢のむくみ・痛み、胸の痛み、突然の息切れ

[高血圧性脳症、高血圧性クリーゼ]頭痛、吐き気、早朝のおう吐、一時的な視力障害、目のかすみ、片側のまひ、言葉が出にくい、けいれん、肩こり、めまい、意識の低下、意識の消失、鼻血

[可逆性後白質脳症症候群]頭痛、意識の低下、意識の消失、けいれん、視力障害

[ネフローゼ症候群]尿量が減る、排尿時の尿の泡立ちが強い、息苦しい、尿が赤みを帯びる、むくみ、体がだるい、体重の増加

[骨髄抑制(汎血球減少症、好中球減少、白血球減少、貧血、血小板減少)]発熱、寒気、喉の痛み、鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、出血が止まりにくい、頭が重い、動悸、息切れ

[感染症(肺炎、敗血症、壊死性筋膜炎等)]発熱、咳、痰、息切れ、息苦しい、寒気、脈が速くなる、体がだるい、皮膚が赤～赤紫色にはれる、痛みを伴う水ぶくれができる、進行すると皮膚は黒色になり、皮膚と筋肉がただれたり、くずれたりする

[うっ血性心不全]息苦しい、息切れ、疲れやすい、むくみ、体重の増加

[間質性肺炎]咳、息切れ、息苦しい、発熱

[血栓性微小血管症(血栓性血小板減少性紫斑病、溶血性尿毒症症候群等)]血が出やすくなる、鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、血尿

[動脈解離]激しい胸の痛み・腹痛・背中痛み

◎ **上記のほかにも副作用が現れることがあります。**

**他にもからだの異常を感じたら、主治医や薬剤師、看護師に相談してください。**