

< あなたの治療について >




婦人科-DC/BV-卵巣-q3w

今回の治療は、DC/BV療法という治療法で、ドセタキセル( DOC )とカルボプラチン( CBDCA )とアバスチン( BV )という3種類の注射薬を併用して行います。ドセタキセルとカルボプラチンとアバスチンは、いずれも腫瘍の増殖を抑えるお薬です。3つの薬を組み合わせることで、より効果を高めることができます。

治療全体の流れ

今回の化学療法は3週間が1コースとなっています。各コースの1日目に点滴を行います。この治療を3週間( 21日間 )ごとに6回繰り返します。副作用が強く出たり、体調がすぐれない場合は回復するまで、治療を延期したり、お薬の量を減らしたりすることがあります。

1コース分の治療スケジュール

順序	薬剤商品名 (薬の作用)	投与	1日目	2~21日目
	デキサート グラニセトロン (吐き気止め)	点滴 約15分		お休み
	ドセタキセル (抗がん剤) 75mg/m <sup>2</sup>	点滴 約1時間		
	カルボプラチン (抗がん剤) 6AUC	点滴 約1時間		
	アバスチン (抗がん剤) 15mg/kg	点滴 初回90分 2回目60分 3回目以降 30分		

点滴中や点滴後に、注射部位が痛い、赤くなってはれる、水ぶくれができる、ただれるなどの症状に気づいたときは、すぐに申し出てください。また点滴中は、腕を動かすことにより針がずれ、点滴漏れが生ずることがありますので気をつけて下さい。

起こりやすい副作用について (頻度20%以上)

ドセタキセル・カルボプラチン・アバスチンについて

白血球減少、好中球減少、血小板減少、ヘモグロビン減少、赤血球減少、ヘマトクリット値減少  
嘔気・嘔吐、悪心、食欲不振、全身倦怠感、脱毛

特徴的な副作用について

ドセタキセルにおける

過敏症状

呼吸困難、気管支痙攣、血圧低下、胸部圧迫感、発疹等

心不全

「階段や坂道をすこしのぼっただけで息切れがする、疲れやすい;足がむくむ、横になると息苦しく座っている

方が楽である，夜間にせき込む」などの症状

### 血圧低下

### 不整脈、動悸等

「めまい，動悸，胸が痛む，胸部の不快感，脈が跳ぶような感じ」などの症状

### アバスチンにおける

### ショック・アナフィラキシー様症状

「顔が赤く熱くなる，皮膚が痒い，蕁麻疹がでる，唇や舌・手足がしびれる，くしゃみ・咳が出る，気分が悪い，心臓がドキドキする，尿意や便意を生じる，喉がつまる，息が苦しい，目の前が暗くなる」などの症状

**\* 投与時間は初回 90 分、2 回目 60 分、3 回目以降 30 分と短縮することがあります。**

### 創傷治癒遅延

手術後の傷口の治りが遅れる

**\* 手術の後、手術を行う場合は医師に確認してください。**

### 高血圧

高血圧になることがありますので、治療期間中は定期的に血圧を測定することが大切です

### 脳出血

「鼻血，歯ぐきからの出血；青あざができる；痰に血が混じる；吐き気，嘔吐；頭痛，突然のひどい頭痛；顔や手足の片側がしびれる」などの症状


**\* 上記症状が現れたときは、必ず医師・看護師・薬剤師にご相談下さい。**

### 副作用の発現時期の目安

\*この図は、今回用いられている抗癌剤による副作用だけでなく、他の抗癌剤によって起こる副作用も含まれています。

これらの副作用がすべてあらわれるわけではありません。

また、発現する時期や程度も抗がん剤の種類や患者さんの体質により個人差があります。



### 副作用の対策について

吐き気・嘔吐，下痢と便秘，口内炎，感染症，出血，貧血，脱毛などの副作用の対策について知りたい方は、資料をお渡しすることができますのでお申し出下さい。

## 薬品毎の副作用について（添付文書における重大な副作用を製薬会社作成「薬のしおり」などから抜粋）

まれな副作用ですが、このような症状が現れた際には医師・薬剤師・看護師へご相談下さい。

### 【ドセタキセル】

<骨髄抑制>発熱、寒気がする、のどが痛む；口の中に白い斑点ができる；手足に赤い点（点状出血）または赤いあざ（紫斑）ができる、出血しやすい（歯ぐきの出血・鼻血など）；水のような下痢；口内炎；通常の生活をしていてだるさが続く、ちょっとした階段や坂で動悸や息切れを感じる、顔色が悪いといわれる

<ショック症状、アナフィラキシー様症状>顔が赤く熱くなる、皮膚が痒い、蕁麻疹が出る、唇や舌・手足がしびれる、くしゃみ・咳が出る、気分が悪い、心臓がドキドキする、尿意や便意を生じる、喉がつまる、息が苦しい、目の前が暗くなる

<黄疸、肝不全、肝機能障害>したいに強くなる全身のだるさ、皮膚や白目が黄色くなる、体がかゆい、黄褐色尿（泡まで黄色い）、淡黄色便；時間や場所を以前より多く間違える、物を取り違える；手が震える；十分睡眠をとっているのにいつもとうとうとしてしまう；いつもおなかが張っている、すこし食べるとすぐおなかがいっぱいになる、発熱（38～39）ぶつぶつ様の発疹、食欲がなくなる、気分が悪くなる、下痢になる

<急性腎不全>顔や手足がむくむ、からだかただるい、尿の量が減る、尿が赤みを帯びる、発熱、発疹、お腹が痛む、吐き気、下痢、節々が痛む、体重が減る

<間質性肺炎、肺線維症>息切れがする、動いたときに息苦しくなる；発熱；から咳がでる；体がだるい；体重が減る

<心不全>階段や坂道をすこしのぼっただけで息切れがする、疲れやすい；足がむくむ、横になると息苦しく座っている方が楽である、夜間にせき込む

<播種性血管内凝固症候群>出血しやすい、血が止まりにくい

<腸管穿孔、胃腸出血>急にお腹が痛む、お腹が張る感じ；嘔吐、吐いたものに血が混じる；便が黒くなる

<虚血性大腸炎、大腸炎>お腹の痛み；頻回の下痢、水のような下痢、トマトジュースのような下痢

<イレウス>便秘、頑固な便秘；だんだん強くなる腹部膨満、吐き気

<急性呼吸不足症候群>息が苦しい、せきがでる、不安になる、呼吸がはやくなる、脈がはやくなる、汗が出る、体重が減る

<急性膵炎>急に胃のあたりがひどく痛む、食欲がない、吐き気

<皮膚粘膜剥離症候群>発熱；関節が痛い；皮膚が斑に赤くなる、水腫れができる；くちびる、口内がある；目が充血する

<中毒性表皮壊死症>発熱；発疹、皮膚が赤くなる、皮膚が剥けるように熱く感じる、皮膚の痛み、水腫れができる；口内がある

<多形紅斑>全身の皮膚に痒みや部分的に痛み・熱感を伴った赤いまだらのいろいろな形の発疹や水泡ができる

<心タンポナーデ>胸の痛み、息苦しさ、動悸、むくみ、胸郭の締めつけられる感じ

<肺水腫>息苦しい；座っている方が呼吸が楽である；呼吸回数が増える；胸が痛い、悪心・嘔吐、咳込む、脈が速くなる、ピンク色の泡沫の痰が出る

<浮腫、体液貯留>足がむくむ、顔面やまぶたが腫れぼったくなる；体重が急激に増加した、ちょっとした階段や坂で動悸や息切れを感じる

<心筋梗塞>急な胸の強い痛み、胸が締めつけられるような感じがする、胸が圧迫されるように苦しい

<静脈血栓塞栓症>頭痛、特に繰り返す頭痛、気分不快、吐き気、嘔吐；ろれつが回らない；視野の変化、ものが見えにくい；突然起こる腹痛、ひどい腹痛、腹痛が続くとき；鋭い胸の痛み、息切れ；それ以外の足の痛み、特にふくらはぎの痛み；手足の脱力、むくみ、しびれ

<感染症>発熱、喉が痛む、咳が出る、痰が出る、口内炎、発疹、水腫れができる、尿の回数が増える、尿が濁る、排尿時に痛みを感じる

<抗利尿ホルモン不適合分泌症候群>むくみのない短期間で体重増加、頭痛；吐き気、嘔吐；めまい；全身のだるさ

### 【カルボプラチン】

<汎血球減少等の骨髄抑制>発熱、悪寒、咳、鼻水が出る、めまい、出血しやすい、血が止まりにくい、あざができる、体がだるい、疲れやすい、息切れ、のどの痛み

<ショック・アナフィラキシー様症状>唇や爪などが青紫色になる、胸や息が苦しくなる、急に気分が悪くなる、めまいがする

<間質性肺炎>発熱、咳、胸や息が苦しくなる

<急性腎不全>尿の出が悪くなる、血尿が出る

<肝不全、肝機能障害、黄疸> 黄疸が出る  
<消化管壊死、消化管穿孔、消化管出血、消化管潰瘍> 激しい腹痛、下血  
<脳梗塞、肺梗塞> 意識の低下、手足のしびれ、息苦しい  
<血栓・塞栓症> 手足のしびれ、息苦しい  
<心筋梗塞、うっ血性心不全> 動悸、息切れ、胸が痛い、苦しい  
<溶血性尿毒症候群> 出血しやすい、血が止まりにくい、尿の出が悪くなる、皮膚や白目が黄色くなる、めまいがする、皮膚に紫色の斑点ができる  
<急性呼吸窮乏症候群> 急に呼吸が困難になる  
<播種性血管内凝固症候群> 出血しやすい、血が止まりにくい  
<急性膵炎> 上腹部の激痛  
<出血性腸炎、偽膜性大腸炎> 激しい腹痛、下痢  
<麻痺性イレウス> 食欲不振、悪心・嘔吐、著しい便秘、腹痛、腹部の膨満、腸内容物のうっ滞

## 【アバスタチン】

<消化管穿孔> 激しい腹痛、吐き気、おう吐、便秘、便に血が混じる（赤～黒っぽい便が出る）  
<創傷治癒遅延> 傷口が治りにくい、傷口が開く、傷口から出血する  
<消化管出血> 激しい腹痛、血を吐く、便に血が混じる（赤～黒っぽい便が出る）  
<肺出血> 痰に血が混じる、血を吐く  
<脳出血> 頭痛、吐き気、おう吐、片側の手足のまひ、強いしびれ、意識がもうろうとする  
<脳血管発作、一過性脳虚血発作、脳虚血、脳梗塞> 頭が重い、頭痛、吐き気、おう吐、しゃべりにくくなる、顔や手足のまひ、しびれ、めまい、意識がもうろうとする、視力が低下する  
<心筋梗塞、狭心症> 胸が痛い、胸が苦しい  
<高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ> 頭痛、吐き気、意識がもうろうとする、けいれん  
<可逆性後白質脳症候群> 頭痛、ぼんやりする、ふらつき、覚えられない、物忘れ、けいれん、しゃべりにくい、見えにくい、眼のかすみ、明暗がわからない、意識がなくなる  
<ショック、アナフィラキシー様症状> 寒気がする、冷汗が出る、手足がしびれる、立ちくらみ、呼吸困難、胸が苦しい、発疹、じんましん、かゆみ、むくみ、口唇やのどがはれる、血圧が下がる  
<粘膜出血> 鼻血が出る、歯ぐきから出血する、腔から出血する  
<深部静脈血栓症、肺塞栓症等の静脈血栓塞栓症> 片方のふくらはぎが赤く腫れたり、ふくらはぎを押すと痛む、急に息苦しく感じたり、胸苦しさを感ずる  
<ネフローゼ症候群> 尿の量が減る、体がだるい、疲れやすい、尿が出にくい  
<好中球減少症> 熱が出る、体がだるい、のどが痛いなどのかぜのような症状  
<うっ血性心不全> 息切れがする、胸が痛い、胸が苦しい

**上記のほかにも副作用が現れることがあります。**

**他にもからだの異常を感じたら、主治医や薬剤師、看護師に相談してください。**