

< あなたの治療について >

呼内-Atezo/BV-nonSq-q3w

今回の治療は、Atezo/BV 療法という治療法で、テセントリク（Atezo）とアバスチン（BV）という2種類の注射薬を併用して行います。テセントリク、アバスチンは、どちらも腫瘍の増殖を抑えるお薬です。2つの薬を組み合わせることで、より効果を高めることができます。

治療全体の流れ

今回の化学療法は3週間が1コースとなっています。各コースの1日目に点滴を行います。この治療を3週間(21日間)ごとに繰り返します。副作用が強く出たり、体調がすぐれない場合は回復するまで、治療を延期したり、お薬の量を減らしたりすることがあります。

1コース分の治療スケジュール

順序	薬剤商品名 (薬の作用)	投与	1日目	2~21日目
	テセントリク (抗がん剤) 1200mg/body	点滴 初回 60分 2回目以降 30分		お休み
	アバスチン (抗がん剤) 15mg/kg	点滴 30分		

点滴中や点滴後に、注射部位が痛い、赤くなったりはれる、水ぶくれができる、ただれるなどの症状に気づいたときは、すぐに申し出てください。また点滴中は、腕を動かすことにより針がずれ、点滴漏れが生ずることがありますので気をつけて下さい。

特徴的な副作用について

テセントリクにおける

間質性肺疾患

「発熱、から咳、息苦しい」などの症状

肝障害

「発熱(38~39℃)、ぶつぶつ様の発疹、食欲がなくなる、気分が悪くなる、下痢になる、しだいに強くなる全身のだるさ、皮膚や白目が黄色くなる、体がかゆい」などの症状

甲状腺機能障害、下垂体機能障害、副腎機能障害

「全身倦怠感、むくみ、発汗、体重減少、意識がうすれる、血圧低下」などの症状

Infusion reaction

「発熱、悪寒、そう痒症、発疹、高血圧、低血圧、呼吸困難等」などの症状

アバスチンにおける

ショック・アナフィラキシー様症状

「顔が赤く熱くなる、皮膚が痒い、蕁麻疹がでる、唇や舌・手足がしびれる、くしゃみ・咳が出る、気分が悪い、心臓がドキドキする、尿意や便意を生じる、喉がつまる、息が苦しい、目の前が暗くなる」などの症状

創傷治癒遅延

手術後の傷口の治りが遅れる

*手術の後、手術を行う場合は申し出て下さい。

高血圧

高血圧になることがありますので、治療期間中は定期的に血圧を測定することが大切です。

脳出血

「鼻血、歯ぐきからの出血；青あざができる；痰に血が混じる；吐き気、嘔吐；頭痛、突然のひどい頭痛；顔や手足の片側がしびれる」などの症状


*** 上記症状が現れたときは、必ず医師・看護師・薬剤師にご相談下さい。**

副作用の発現時期の目安

*この図は、今回用いられている抗癌剤による副作用だけでなく、他の抗癌剤によって起こる副作用も含まれています。

これらの副作用がすべてあらわれるわけではありません。

また、発現する時期や程度も抗癌剤の種類や患者さんの体質により個人差があります。



副作用の対策について

吐き気・嘔吐、下痢と便秘、口内炎、感染症、出血、貧血、脱毛などの副作用の対策について知りたい方は、資料をお渡しすることができますのでお申し出下さい。

薬品毎の副作用について(添付文書における重大な副作用を製薬会社作成「薬のしおり」などから抜粋)

まれな副作用ですが、このような症状が現れた際には医師・薬剤師・看護師へご相談下さい。

【テセントリク】

- <間質性肺疾患>発熱、から咳、息苦しい
- <肝機能障害、肝炎>からだがだるい、白目が黄色くなる、かゆみ
- <大腸炎、重度の下痢>嘔吐(おうと)、腹痛、下痢、泥状の便
- <膀胱炎>吐き気、嘔吐、胃・おなかの激しい痛み、背中痛み
- <1型糖尿病>からだがだるい、のどの渇き、尿の量が増える、意識の低下
- <甲状腺機能障害>汗をかきやすい、胸がドキドキする、からだがだるい、寒がりになる
- <副腎機能障害>からだがだるい、意識がうすれる、低血圧
- <下垂体機能障害>からだがだるい、頭がぼーっとしたり意識がなくなったりする、血圧低下
- <脳炎、髄膜炎>発熱、頭痛、意識の低下
- <神経障害>運動のまひ、手足のしびれ、指先のしびれ、歩行困難
- <重症筋無力症>まぶたが重い、上まぶたが下がる、物がたぶって見える、筋肉の疲労感
- <中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形赤斑>まぶたや眼の充血、唇や口内のただれ、発疹、みずぶくれ
- <腎障害>むくみ、頭痛、尿量が減る

<筋炎、横紋筋溶解症>脱力感、筋肉の痛み、息苦しい、赤褐色尿

<インフュージョン・リアクション>呼吸困難、意識障害、まぶた・唇・舌のはれ

<発熱性好中球減少症>熱が出る、体がだるい、のどが痛いなどのかぜのような症状

【アバスチン】

<消化管穿孔>激しい腹痛、吐き気、おう吐、便秘、便に血が混じる（赤～黒っぽい便が出る）

<創傷治癒遅延>傷口が治りにくい、傷口が開く、傷口から出血する

<消化管出血>激しい腹痛、血を吐く、便に血が混じる（赤～黒っぽい便が出る）

<肺出血>痰に血が混じる、血を吐く

<脳出血>頭痛、吐き気、おう吐、片側の手足のまひ、強いしびれ、意識がもうろうとする

<脳血管発作、一過性脳虚血発作、脳虚血、脳梗塞>頭が重い、頭痛、吐き気、おう吐、しゃべりにくくなる、顔や手足のまひ、しびれ、めまい、意識がもうろうとする、視力が低下する

<心筋梗塞、狭心症>胸が痛い、胸が苦しい

<高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ>頭痛、吐き気、意識がもうろうとする、けいれん

<可逆性後白質脳症候群>頭痛、ぼんやりする、ふらつき、覚えられない、物忘れ、けいれん、しゃべりにくい、見えにくい、眼のかすみ、明暗がわからない、意識がなくなる

<ショック、アナフィラキシー様症状>寒気がする、冷汗が出る、手足がしびれる、立ちくらみ、呼吸困難、胸が苦しい、発疹、じんましん、かゆみ、むくみ、口唇やのどがはれる、血圧が下がる

<粘膜出血>鼻血が出る、歯ぐきから出血する、膣から出血する

<深部静脈血栓症、肺塞栓症等の静脈血栓塞栓症>片方のふくらはぎが赤く腫れたり、ふくらはぎを押すと痛む、急に息苦しく感じたり、胸苦しさを感ずる

<ネフローゼ症候群>尿の量が減る、体がだるい、疲れやすい、尿が出にくい

<好中球減少症>熱が出る、体がだるい、のどが痛いなどのかぜのような症状

<うつ血性心不全>息切れがする、胸が痛い、胸が苦しい

上記のほかにも副作用が現れることがあります。

他にもからだの異常を感じたら、主治医や薬剤師、看護師に相談してください。