

< あなたの治療について >

呼内-CBDCA/ALI/BV-NSCLC-q3w

今回の治療は、CBDCA/ALI/BV療法という治療法で、カルボプラチン(CBDCA)とアリムタ(ALI)とアバスチン(BV)という3種類の注射薬を併用して行います。カルボプラチン、アリムタ、アバスチンは、いずれも腫瘍の増殖を抑えるお薬です。3つの薬を組み合わせることで、より効果を高めることができます。

治療全体の流れ

今回の化学療法は3週間が1コースとなっています。各コースの1日目に点滴を行います。この治療を3週間(21日間)ごとに6回繰り返します。副作用が強く出たり、体調がすぐれない場合は回復するまで、治療を延期したり、お薬の量を減らしたりすることがあります。また、副作用の予防として治療7日前よりパンピタン末(総合ビタミン)の内服及びメチコパール(ビタミンB12)の筋注を行います。

1コース分の治療スケジュール

	薬剤商品名 (薬の作用)	投与	1日目	2~3日目	4~21日目
	アプレピタント (吐き気止め)	内服	125	80	お休み

順序	薬剤商品名 (薬の作用)	投与	1日目	2~21日目
	デキサート アロキシ (吐き気止め)	点滴 約30分		お休み
	アリムタ (抗がん剤) 500mg/m ²	点滴 約10分		
30分以上、間隔をあけます。				
	カルボプラチン (抗がん剤) 6AUC	点滴 約60分		
	アバスチン (抗がん剤) 15mg/kg	点滴 初回90分 2回目60分 3回目以降 30分		

点滴中や点滴後に、注射部位が痛い、赤くなつてはれる、水ぶくれができる、ただれるなどの症状に気づいたときは、すぐに申し出てください。また点滴中は、腕を動かすことにより針がずれ、点滴漏れが生ずることがありますので気をつけて下さい。

起こりやすい副作用について(頻度20%以上)

アリムタ・カルボプラチン・アバスチンについて

白血球減少、好中球減少、リンパ球減少、血小板減少、ヘモグロビン減少、赤血球減少、ヘマトクリ

ット値減少 悪心、嘔気・嘔吐、食欲不振 血中尿素増加 倦怠感

特徴的な副作用について

アリムタにおける

発疹

間質性肺炎

「息切れがする、息苦しくなる；から咳が出る、発熱」などの症状

*** 上記症状が現れたときは、必ず医師・看護師・薬剤師にご相談下さい。**

アバスチンにおける

ショック・アナフィラキシー様症状

「顔が赤く熱くなる、皮膚が痒い、蕁麻疹がでる、唇や舌・手足がしびれる、くしゃみ・咳が出る、気分が悪い、心臓がドキドキする、尿意や便意を生じる、喉がつまる、息が苦しい、目の前が暗くなる」などの症状

創傷治癒遅延

手術後の傷口の治りが遅れる

*** 手術の後、手術を行う場合は申し出て下さい。**

高血圧

高血圧になることがありますので、治療期間中は定期的に血圧を測定することが大切です。

脳出血

「鼻血、歯ぐきからの出血；青あざができる；痰に血が混じる；吐き気、嘔吐；頭痛、突然のひどい頭痛；顔や手足の片側がしびれる」などの症状


*** 上記症状が現れたときは、必ず医師・看護師・薬剤師にご相談下さい。**

副作用の発現時期の目安

*この図は、今回用いられている抗癌剤による副作用だけでなく、他の抗癌剤によって起こる副作用も含まれています。

これらの副作用がすべてあらわれるわけではありません。

また、発現する時期や程度も抗がん剤の種類や患者さんの体質により個人差があります。



副作用の対策について

吐き気・嘔吐，下痢と便秘，口内炎，感染症，出血，貧血，脱毛などの副作用の対策について知りたい方は、資料をお渡しすることができますのでお申し出下さい。

薬品毎の副作用について（添付文書における重大な副作用を製薬会社作成「薬のしおり」などから抜粋）

まれな副作用ですが、このような症状が現れた際には医師・薬剤師・看護師へご相談下さい。

【アリムタ】

- <骨髄抑制>発熱、寒気がする、のどが痛む；口の中に白い斑点ができる；手足に赤い点（点状出血）または赤いあざ（紫斑）ができる、出血しやすい（歯ぐきの出血・鼻血など）；水のような下痢；口内炎；通常の生活をしていてだるさが続く、ちょっとした階段や坂で動悸や息切れを感じる、顔色が悪いといわれる
- <間質性肺炎>息切れがする、息苦しくなる；から咳が出る、発熱
- <重度の下痢>発熱、激しい腹痛、下痢、水様便、血便
- <脱水>発熱、激しい腹痛、下痢、水様便、血便
- <腎不全>顔や手足がむくむ、からだがだるい、尿の量が減る、尿が赤みを帯びる、発熱、発疹、お腹が痛む、吐き気、下痢、節々が痛む、体重が減る

【カルボプラチン】

- <汎血球減少等の骨髄抑制> 発熱、悪寒、咳、鼻水が出る、めまい、出血しやすい、血が止まりにくい、あざができる、体がだるい、疲れやすい、息切れ、のどの痛み
- <ショック・アナフィラキシー様症状> 唇や爪などが青紫色になる、胸や息が苦しくなる、急に気分が悪くなる、めまいがする
- <間質性肺炎> 発熱、咳、胸や息が苦しくなる
- <急性腎不全> 尿の出が悪くなる、血尿が出る
- <肝不全、肝機能障害、黄疸> 黄疸が出る
- <消化管壊死、消化管穿孔、消化管出血、消化管潰瘍> 激しい腹痛、下血
- <脳梗塞、肺梗塞> 意識の低下、手足のしびれ、息苦しい
- <血栓・塞栓症> 手足のしびれ、息苦しい
- <心筋梗塞、うっ血性心不全> 動悸、息切れ、胸が痛い、苦しい
- <溶血性尿毒症候群> 出血しやすい、血が止まりにくい、尿の出が悪くなる、皮膚や白目が黄色くなる、めまいがする、皮膚に紫色の斑点ができる
- <急性呼吸窮乏症候群> 急に呼吸が困難になる
- <播種性血管内凝固症候群> 出血しやすい、血が止まりにくい
- <急性膵炎> 上腹部の激痛
- <出血性腸炎、偽膜性大腸炎> 激しい腹痛、下痢
- <麻痺性イレウス> 食欲不振、悪心・嘔吐、著しい便秘、腹痛、腹部の膨満、腸内容物のうっ滞

【アバステン】

- <消化管穿孔> 激しい腹痛、吐き気、おう吐、便秘、便に血が混じる（赤～黒っぽい便が出る）
- <創傷治癒遅延> 傷口が治りにくい、傷口が開く、傷口から出血する
- <消化管出血> 激しい腹痛、血を吐く、便に血が混じる（赤～黒っぽい便が出る）
- <肺出血> 痰に血が混じる、血を吐く
- <脳出血> 頭痛、吐き気、おう吐、片側の手足のまひ、強いしびれ、意識がもうろうとする
- <脳血管発作、一過性脳虚血発作、脳虚血、脳梗塞> 頭が重い、頭痛、吐き気、おう吐、しゃべりにくくなる、顔や手足のまひ、しびれ、めまい、意識がもうろうとする、視力が低下する
- <心筋梗塞、狭心症> 胸が痛い、胸が苦しい
- <高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ> 頭痛、吐き気、意識がもうろうとする、けいれん
- <可逆性後白質脳症候群> 頭痛、ぼんやりする、ふらつき、覚えられない、物忘れ、けいれん、しゃべりにくい、見えにくい、眼のかすみ、明暗がわからない、意識がなくなる
- <ショック、アナフィラキシー様症状> 寒気がする、冷汗が出る、手足がしびれる、立ちくらみ、呼吸困難、胸が苦しい、発疹、じんましん、かゆみ、むくみ、口唇やのどがはれる、血圧が下がる
- <粘膜出血> 鼻血が出る、歯ぐきから出血する、膣から出血する
- <深部腓骨動脈血栓症、肺塞栓症等の静脈血栓塞栓症> 片方のふくらはぎが赤く腫れたり、ふくらはぎを押すと痛む、急に息苦しく感じたり、胸苦しさを感ずる
- <ネフローゼ症候群> 尿の量が減る、体がだるい、疲れやすい、尿が出にくい

<好中球減少症>熱が出る、体がだるい、のどが痛いなどのかぜのような症状

<うつ血性心不全>息切れがする、胸が痛い、胸が苦しい

上記のほかにも副作用が現れることがあります。

他にもからだの異常を感じたら、主治医や薬剤師、看護師に相談してください。