

新規採用医薬品 No.134

2025 年 6 月
一宮市立市民病院
薬 剤 局

【新規正規採用医薬品】

イノソリッド配合経腸用半固形剤 大塚製薬工場

組成: 1 バッグ 300g (300kcal) 中 下記の成分・分量を含有

配合成分(有効成分)	1 バッグ中	配合成分(有効成分)	1 バッグ中
濃縮乳たん白質	12.015 g	粉寒天	750 mg
カゼインナトリウム	3.996 g	アルギン酸	600 mg
トリカプリリン	1350.0 mg	セレン酸ナトリウム	26.04 µg
ダイズ油	4.845 g	塩化クロム六水和物	63.51 µg
シソ油	588.0 mg	モリブデン酸ナトリウム二水和物	3.825 µg
魚油	618.9 mg	ビタミン A 油 (1g 中 100 万 IU 含有)	999.9 µg
マルトデキストリン	42.18 g	コレカルシフェロール	5.010 µg
イヌリン	3.282 g	トコフェロール酢酸エステル	7.605 mg
クエン酸ナトリウム水和物	530.7 mg	フィトナジオン	13.035 µg
塩化ナトリウム	438.3 mg	チアミン塩化物塩酸塩	468.9 µg
炭酸カリウム	204.75 mg	リボフラビンリン酸エステルナトリウム	545.1 µg
クエン酸カリウム	111.3 mg	ピリドキシン塩酸塩	532.8 µg
乳酸カルシウム水和物	101.4 mg	シアノコバラミン	1050.0 ng
塩化マグネシウム	929.1 mg	L-アスコルビン酸ナトリウム	75.27 mg
リン酸ニカリウム	773.4 mg	ニコチン酸アミド	5.010 mg
グルコン酸第一鉄	34.17 mg	パントテン酸カルシウム	2175.0 µg
硫酸亜鉛水和物	10.287 mg	葉酸	74.04 µg
硫酸マンガン(II)五水和物	5.820 mg	ビオチン	16.680 µg
硫酸銅	1119.9 µg	L-カルニチン	50.10 mg
ヨウ化カリウム	38.58 µg	コリン塩化物	246.09 mg

効能・効果: 一般に、手術後患者の栄養保持に用いることができるが、特に長期にわたり、
経口的食事摂取が困難な場合の経管栄養補給に使用する。

用法・用量: 通常、成人標準量として 1 日 900～1,500g (900～1,500kcal) を胃瘻より胃内に
1 日数回に分けて投与する。投与時間は 100g 当たり 2～4 分 (300g 当たり 6～

12分)とし、1回の最大投与量は600gとする。

また、初めて投与する場合は、投与後によく観察を行い臨床症状に注意しながら増量して数日で標準量に達するようにする。

なお、年齢、体重、症状及び栄養状態により投与量、投与時間を適宜増減する。

1. 本剤はラコール NF 配合経腸用液等の液体経腸栄養剤と比べ、投与にかかる時間を短縮することが可能な1.0kcal/gの半固形経腸栄養剤である。
2. 本剤は日本人の食事摂取基準(2020年版)に基づき、ヨウ素・セレン・クロム・モリブデンを配合した製剤である。
3. 本剤は維持エネルギー量の低い患者の栄養管理にも配慮し、900kcalの投与で1日に必要なビタミン・微量元素をほぼ充足できるよう処方設計された製剤である。
4. 薬価は 1g 1.44 円。(1袋 432 円)

コララン錠 2.5mg

小野薬品工業

組成:1錠中 イバブラジン 2.5mg

効能・効果: 洞調律かつ投与開始時の安静時心拍数が75回/分以上の慢性心不全

ただし、β遮断薬を含む慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。

用法・用量: 通常、成人にはイバブラジンとして、1回2.5mgを1日2回食後経口投与から開始する。開始後は忍容性をみながら、目標とする安静時心拍数が維持できるように、必要に応じ、2週間以上の間隔で段階的に用量を増減する。1回投与量は2.5、5又は7.5mgのいずれかとし、いずれの投与量においても、1日2回食後経口投与とする。なお、患者の状態により適宜減量する。

1. 本剤は洞結節にあるHyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated(HCN;過分極活性化環状ヌクレオチド依存性)チャネルを阻害する新規作用機序の慢性心不全治療薬である。
2. 本剤はHCN4チャネルを阻害し活動電位の拡張期脱分極相における立ち上がり時間を遅延することで心拍数を減少させる製剤である。
3. 本剤は「循環器内科限定」の採用薬医薬品である。
4. 薬価は 1錠 82.9 円。

【正規採用規格追加医薬品】

ビムパットドライシロップ 10%

第一三共

1. 「ビムパット錠50mg」は正規採用医薬品として既採用。
2. 薬価は 1g 391 円

【正規採用規格変更医薬品】

パルモディア XR 錠 0.2mg

興和

1. 本剤はパルモディア錠 0.1mg からの切り替えである。
2. 本剤は 1 日 1 回服用のマルチプルユニット型徐放性製剤である。
3. 薬価は 1 錠 60 円。

【先発から後発への切り替え医薬品】

スガマデクス静注液シリンジ 200mg 「F」

富士製薬工業

1. 本剤は「ブリディオ静注 200mg」からの切り替えである。
2. 本剤はルアーロックタイプのプレフィルドシリンジ製剤(充填済みシリンジ製剤)であるため薬液の吸引が不要な製剤である。
3. 薬価は 1 筒 2,823 円。

【正規採用製造中止等に伴う切り替え医薬品】

イオパミドール 150 注 50mL 「F」

富士製薬工業

1. 薬剤は「イオパミロン注 150・50mL」からの切り替えである。
2. 薬価は 1 瓶 2,610 円。

バルサルタン錠 80mg 「トーワ」

東和薬品

1. 本剤は「バルサルタン錠 80mg 「JG」」からの切り替えである。
2. 薬価は 1 錠 13.2 円。

ヘパリンナトリウム注 N1 万単位/10mL 「AY」

陽進堂

1. 本剤は「ヘパリンナトリウム注 N5 千単位/5mL 「AY」」からの切り替えである。
2. 本剤は「小児科限定」の採用薬医薬品である。
3. 薬価は 1 瓶 391 円。

【院外専用採用医薬品】

アポハイドローション 20%

久光製薬

組成:1g 中 日局オキシブチニン塩酸塩 200mg

効能・効果: 原発性手掌多汗症

用法・用量: 1 日 1 回、就寝前に適量を両手掌全体に塗布する。

1. 本剤は原発性手掌多汗症に対し効能又は効果を有する外用剤(保険適用)として日本初の製剤である。
2. 本剤はエクリン汗腺に発現するムスカリン受容体に対して抗コリン作用を有することにより抑汗作用を示す製剤である。
3. 薬価は 1g 543.7 円。(1本 2,348.784 円)

アレジオン眼瞼クリーム 0.5%

参天製薬

組成:1g 中 エピナスチン塩酸塩 5mg

効能・効果: アレルギー性結膜炎

用法・用量: 通常、適量を1日1回上下眼瞼に塗布する。

1. 本剤は世界で初めての1日1回眼周囲(上下眼瞼)へ塗布するクリームタイプのアレルギー性結膜炎治療剤である。
2. 本剤は1日1回の投与で終日にわたり有効性を維持でき、また点眼が困難であるアレルギー性結膜炎患者が容易かつ適切に投与するために開発された新しい剤形の製剤である。
3. 薬価は 1g 1,686.7 円。(1本 3,373.4 円)

リットフォーロカプセル 50mg

ファイザー

組成:1カプセル中 リトレチニブとして 50mg

効能・効果: 円形脱毛症(ただし、脱毛部位が広範囲に及ぶ難治の場合に限る)

用法・用量: 通常、成人及び12歳以上の小児には、リトレチニブとして50mgを1日1回経口投与する。

1. 本剤はアデノシン三リン酸(ATP)との結合を阻害することによりヤヌスキナーゼ(JAK)3及び5種類の tyrosine kinase expressed in hepatocellular carcinoma (TEC)ファミリーキナーゼ(BMX、BTK、ITK、TEC 及び TXK)を不可逆的に阻害する製剤である。
2. 本剤は TEC ファミリーキナーゼを不可逆的に阻害することで円形脱毛症の発症に関与していると考えられている CD8 陽性 T 細胞及び NK 細胞の細胞溶解能を阻害する製剤である。
3. 薬価は 1カプセル 5,802.4 円。

【院外専用規格追加医薬品】

ビムパット錠100mg

第一三共

1. 「ビムパット錠50mg」は正規採用医薬品として既採用。
2. 薬価は 1錠 355.5 円。

マンジャロ皮下注 10mg アテオス

田辺三菱製薬

1. 「マンジャロ皮下注 2.5mg アテオス」は正規採用医薬品として既採用。

2. 「マンジャロ皮下注 5mg アテオス」は院外専用採用医薬品として既採用。
3. 「マンジャロ皮下注 7.5mg アテオス」は「糖尿病・内分泌内科、腎臓内科限定」採用医薬品として既採用。
4. 薬価は 1 キット 7,696 円。

【正規採用から院外専用への切り替え医薬品】

アトモセチンカプセル 10mg 「サワイ」

沢井製薬

1. 「アトモセチンカプセル 5mg 「サワイ」」は正規採用医薬品として既採用。
2. 薬価は 1 カプセル 50.3 円。

【正規採用削除医薬品】

アトモセチンカプセル 10mg 「サワイ」

沢井製薬

イオパミオロン注 150・50mL

バイエル薬品

バルサルタン錠 80mg 「JG」

日本ジェネリック

パルモディア錠 0.1mg

興和

ブリディオン静注 200mg

MSD

ミルラクト細粒 50%

高田製薬

ラコール NF 配合経腸用半固形剤

大塚製薬工場

リスモダンカプセル 100mg

チェプラファーム

【院外採用削除医薬品】

アコニンサン錠

化研生薬

ザジテン点眼液 0.05%

ノバルティスファーマ

ハイシー顆粒 25%

武田テバ薬品