

テブダックによる眼障害の予防について

テブダックの副作用で、以下のような眼の症状があらわれることがあります。

眼の充血、眼やまぶたのはれ・痛み、目やに、かゆみ、違和感、異物感、眼の湯き、涙の増加、見えにくい、まぶしい など

眼障害を予防するために、

●**3種類の目薬**を使用します。**普段の点眼**と**治療日の持参**を忘れないようにしてください。

①ドライアイ治療用の目薬（眼の乾きを抑える）

薬剤名の例：ヒアレイン点眼液、ヒアルロン酸Na点眼液 など

・治療開始後、テブダック投与終了後30日目まで1日4回（朝・昼・夕・眠前）点眼します

②ステロイドの目薬（眼の炎症を抑える）

薬剤名の例：フルオロメトロン点眼液、フルメトロン点眼液 など

・テブダック投与前日から4日間、1日4回（朝・昼・夕・眠前）点眼します

・4日間点眼した後の**残薬は破棄**してください

③血管を収縮させる目薬（眼の血流を低下させる）

薬剤名の例：アイファガン点眼液、ブリモニジン酒石酸塩点眼液 など

・テブダック投与開始の約5分前に看護師の指示で点眼します

・次コース分は新しく処方されますので、使用後の**残薬は破棄**してください

●テブダック投与開始5分前から投与終了後30分までの間、冷却パックで眼を冷却します。

●テブダックの治療期間中は**コンタクトレンズの装着は避けて**ください。




テブダック投与期間中の点眼スケジュール

	1コース目					2コース目					
投与前日	1日目 治療日	2日目	3日目	4日目	...	投与前日	1日目 治療日	2日目	3日目	4日目	...
	ヒアレイン 1日4回（テブダック投与終了後30日目まで毎日点眼）										
	フルオロメトロン 1日4回					フルオロメトロン 1日4回					
	●						●				

アイファガンは看護師の指示でテブダック開始約5分前に点眼します
点眼後に眼の冷却を開始します

●：アイファガン

<点滴当日のスケジュール>



<ヒアレインとフルオロメトロンの点眼順序>

順番	薬剤名	朝	昼	夕	眠前
①	ヒアレイン （ヒアルロン酸Naなど）	●	●	●	●
②	フルオロメトロン （フルメトロンなど）	○	○	○	○

※5分以上間隔をあけて点眼してください。