

新規採用医薬品 No. 116

2019年6月

一宮市立市民病院
薬 剤 局

【新規採用医薬品】

アジレクト錠 1mg

武田薬品工業

組成：1錠中 ラサギリンとして 1mg

効能：パーキンソン病

用法：通常、成人にはラサギリンとして 1mg を 1日 1回経口投与する。

1. 本剤は早期及び進行期パーキンソン病のいずれにおいても優れた有効性を示した製剤である。
2. 本剤は 1日 1回投与の非可逆的な選択的 MAO-B 阻害剤である。
3. 本剤はセレギリンと異なりアンフェタミン骨格構造を有しないことからアンフェタミン骨格による不眠症、異常な夢、心臓障害および神経障害のリスクが少なく、さらに覚せい剤原料の規制の対象にならない製剤である。
4. 薬価は 1錠 948.5 円。

イベニティ皮下注 105mg シリンジ

アステラス製薬

組成：1シリンジ (1.17mL) 中 ロモソズマブ (遺伝子組換え) 105mg

効能：骨折の危険性の高い骨粗鬆症

用法：通常、成人にはロモソズマブ (遺伝子組換え) として 210mg を 1カ月に 1回、12カ月皮下投与する。

1. 本剤はヒト化抗スクレロステチンモノクローナル抗体で、骨細胞によって骨の内部で産生される糖タンパク質であるスクレロステチンに結合してこれを阻害することで、骨形成促進作用と骨吸収抑制作用を示す新規作用機序の骨粗鬆症治療薬である。
2. 本剤の骨折抑制効果は 12カ月の投与で検証されており、12カ月を超えた投与では検討されていない製剤である。
3. 本剤は投与後に血清カルシウム値が低下する可能性があるため、投与中は適切なカルシウム及びビタミンDの補給を行う必要がある製剤である。
4. 本剤は 2019年8月末日まで市販直後調査の対象品目となっている。
5. 薬価は 1筒 24,720 円。

エホチール注 10mg

サノフィ

組成：1Ap (1mL) 中 エチレフリン塩酸塩 10mg

効能：起立性低血圧、各種疾患若しくは状態に伴う急性低血圧又はショック時の補助治療

用法：通常成人には1回0.2～1mL（エチレフリン塩酸塩として2～10mg）を皮下注射、筋肉内注射又は静脈内注射する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

1. 本剤は交感神経刺激作用（ α 、 β 刺激）により、心拍出量を増加させる製剤である。
2. 本剤は静脈緊張度の改善により、循環血流量を増加させ、血圧を上昇させる製剤である。
3. 本剤は日本透析医学会の「血液透析患者における心血管合併症の評価と治療に関するガイドライン」の中で、透析関連低血圧に対する昇圧薬としてドーパミンと並んで明記されている薬剤である。
4. 薬価は 1Ap 58 円。

ジャドニュ顆粒分包 360mg

ノバルティスファーマ

組成：1包中 デフェラシロクス 360mg

効能：輸血による慢性鉄過剰症（注射用鉄キレート剤治療が不適當な場合）

用法：通常、デフェラシロクスとして12mg/kgを1日1回、経口投与する。

なお、患者の状態により適宜増減するが、1日量は18mg/kgを超えないこと。

1. 本剤は経口鉄キレート剤であるデフェラシロクスの顆粒剤であり、デフェラシロクス懸濁用錠（エクジェイド懸濁用錠）との生物学的同等性試験に基づいて承認された製剤である。
2. 本剤は水に懸濁することなく服用可能な製剤である。
3. 本剤は食事の摂取にかかわらず服用可能な製剤である。
4. 本剤の投与により、重篤な肝障害、腎障害、胃腸出血を発現し死亡に至った例も報告されていることから、投与開始前、投与中は定期的に血清トランスアミナーゼや血清クレアチニン等の血液検査を行う必要がある。
5. 薬価は 1包 5,707.7 円。

デュピクセント皮下注 300mg シリンジ

サノフィ

組成：1シリンジ（2mL）中 デュピルマブ（遺伝子組換え） 300mg

効能：既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎

気管支喘息（既存治療によっても喘息症状をコントロールできない重症又は難治の患者に限る）

用法：アトピー性皮膚炎の場合

通常、成人にはデュピルマブ（遺伝子組換え）として初回に600mgを皮下投与し、その後は1回300mgを2週間隔で皮下投与する。

気管支喘息の場合

通常、成人及び12歳以上の小児にはデュピルマブ（遺伝子組換え）として初回に600mgを皮下投与し、その後は1回300mgを2週間隔で皮下投与する。

1. 本剤はIL-4/13によるシグナル伝達を阻害し、アトピー性皮膚炎の病態や喘息の気道炎症の主体であるType2炎症反応を上流から下流まで広範囲に抑制するヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体の製剤である。
2. アトピー性皮膚炎の場合、原則として、本剤投与時にはアトピー性皮膚炎の病変部位の状態に応じて抗炎症外用剤の併用が必要な製剤である。
3. アトピー性皮膚炎の場合、本剤による治療反応は、通常投与開始から16週までには得られるため、16週までに治療反応が得られない場合は、投与中止の考慮が必要な製剤である。
4. 本剤は針付きガラス製シリンジに薬液を充填・施栓した単回使用で安全装置付きの製剤である。
5. 本剤は2019年9月末日まで市販直後調査の対象品目となっている。（調査対象：気管支喘息）
6. 薬価は 1筒 81,640 円。

パルモディア錠 0.1mg

興和

組成：1錠中 ペマフィブラート 0.10mg

効能：高脂血症（家族性を含む）

用法：通常、成人にはペマフィブラートとして1回0.1mgを1日2回朝夕に経口投与する。
なお、年齢、症状に応じて適宜増減するが、最大用量は1回0.2mgを1日2回までとする。

1. 本剤はPPAR α （Peroxisome Proliferator-activated receptor- α ）の標的遺伝子の発現を選択的に調節することにより作用を示す高脂血症治療剤である。
2. 本剤は優れたトリグリセライド低下作用を有し、HDL-コレステロール増加作用を示す製剤である。
3. 本剤は、血清クレアチニン値が2.5mg/dL以上の場合は投与の中止、1.5 mg/dL以上2.5mg/dL未満の場合は減量又は投与間隔の延長等が必要な製剤である。
4. 薬価は 1錠 33.9 円。

ミネプロ錠 2.5mg

第一三共

組成：1錠中 エサキセレノン 2.5mg

効能：高血圧症

用法：通常、成人にはエサキセレノンとして2.5mgを1日1回経口投与する。なお、効果不十分な場合は、5mgまで増量することができる。

1. 本剤はミネラルコルチコイド受容体（MR）に選択的に結合し、MRの活性化を阻害する非ステロイド骨格を有する製剤である。

2. 本剤投与中に高カリウム血症があらわれることがあるので、血清カリウム値を原則として投与開始前、投与開始後（又は用量調節後）2週以内及び約1ヵ月時点で測定し、その後も定期的に測定することが必要である。
3. 本剤は糖尿病や中等度腎障害合併の高血圧患者にも投与可能な製剤である。
4. 本剤は2019年11月末日まで市販直後調査の対象品目となっている。
5. 本剤は2020年2月末日まで上限投与日数14日が設けられている。
6. 薬価は 1錠 89.9 円。

レルミナ錠 40mg

あすか製薬

組成：1錠中 レルゴリクス 40mg

効能：子宮筋腫に基づく下記諸症状の改善

過多月経、下腹痛、腰痛、貧血

用法：通常、成人にはレルゴリクスとして40mgを1日1回食前に経口投与する。なお、初回投与は月経周期1～5日目に行う。

1. 本剤は国内初の子宮筋腫の適応を有する1日1回経口投与のGnRHアンタゴニスト製剤である。
2. 本剤はエストロゲン低下作用に基づく骨塩量の低下がみられることがあるため、6ヵ月を超える投与は原則として行わない製剤である。
3. 本剤投与中は非ホルモン性の避妊が必要である。
4. 本剤は2019年8月末日まで市販直後調査の対象品目となっている。
5. 本剤は2020年2月末日まで上限投与日数14日が設けられている。
6. 薬価は 1錠 905.7 円。

【製造中止等に伴う切り替え医薬品】

スルピリン注射液 250mg 「日医工」

日医工

1. 本剤はメチロン注25%からの切り替えである。
2. 薬価は 1Ap 92 円。

ソル・メドロール静注用 125mg・500mg・1000mg

ファイザー

1. 注射用ソル・メルコート125・500・1000からの切り替えである。
2. 薬価は 125mg：1V 803 円、500mg：1V 2,410 円、1000mg：1V 4,423 円。

フロセミド細粒 4% 「EMEC」

日医工

1. 本剤はラシックス細粒4%からの切り替えである。
2. 薬価は 1g 6.4 円。

【先発品から後発品への切り替え医薬品】

アミオダロン塩酸塩静注 150mg「TE」

トーアエイヨー

1. 本剤はアンカロン注 150 からの切り替えである。
2. 本剤は室温保存可能な製剤である。
3. 本剤は使用期限が先発品のアンカロン注 150 より 1 年長い 3 年の製剤である。
4. 薬価は 1Ap 1,249 円。

【正規採用薬剤名・規格変更医薬品】

コカールドライシロップ 40%

三和化学研究所

1. 本剤はカロナール細粒 20%からの切り替えである。
2. 本剤は 1g 中アセトアミノフェン 400mg を含有する製剤である。
3. 薬価は 1g 10.6 円。

【正規採用規格追加医薬品】

フェントステープ0.5mg

協和発酵キリン

1. フェントステープ1mg・2mg・4mgは既採用。
2. 本剤はモルヒネ経口換算 15mg/日未満等のオピオイド鎮痛剤低用量使用患者に対して使用可能な製剤である。
3. 薬価は 1 枚 303.8 円。

【正規採用剤型追加医薬品】

リュープリンPRO注射用キット22.5mg

武田薬品工業

1. リュープリン SR 注射用キット 11.25mg、リュープリン注射用キット 1.88mg、リュープリン注射用キット 3.75mg は既採用。
2. 本剤は 24 週間に 1 回の皮下投与で持続的な有効性を示す製剤である。
3. 薬価は 1 筒 94,108 円。

【正規採用剤型変更医薬品】

アムロジピン OD錠 5mg「明治」

MeijiSeika ファルマ

1. 本剤はアムロジピン錠 5mg「日医工」からの切り替えである。
2. 本剤は舌の上への唾液を湿潤させ、唾液のみで服用可能な製剤である。
3. 本剤は原薬粒子にコーティングを施し、甘味剤、メントールを加えることで原薬の苦味を軽減した製剤である。
4. 薬価は 1錠 18.7 円。

シムジア皮下注 200mg オートクリックス

アステラス製薬

1. 本剤はシムジア皮下注 200mg シリンジからの切り替えである。
2. 本剤は指でボタンを押す必要がないよう設計された自動注射器であり、手を患っている関節リウマチの患者にも使いやすいように、滑り止め加工を施した太いグリップを採用した製剤である。
3. 薬価は 1キット 61,745 円。

【正規採用から院外専用採用への

切り替え医薬品】

カルグート錠 5mg

田辺三菱製薬

1. 薬価は 1錠 32 円。

【院外専用採用医薬品】

イクスタンジ錠 40mg

アステラス製薬

組成：1錠中 エンザルタミド 40mg

効能：去勢抵抗性前立腺癌

用法：通常、成人にはエンザルタミドとして 160mg を 1日 1回経口投与する。

1. 本剤はアンドロゲン受容体のシグナル伝達阻害作用を有する新規抗アンドロゲン剤である。
2. 本剤は直径約 10mm の円形錠であり、製剤の大きさに起因する服用時の負担軽減を目的に開発された製剤である。
3. 本剤はステロイド併用の必要がなく、ステロイドによる副作用に制限されることがない製剤である。
4. 薬価は 1錠 2,354.1 円。

イニシク配合錠

武田薬品工業

組成：1錠中 アログリプチンとして 25mg、メトホルミン塩酸塩 500mg

効能：2型糖尿病

ただし、アログリプチン安息香酸塩及びメトホルミン塩酸塩の併用による治療が適切と判断される場合に限る。

用法：通常、成人には1日1回1錠（アログリプチン/メトホルミン塩酸塩として 25mg/500mg）を食直前又は食後に経口投与する。

1. 本剤は1日1回1錠のDPP-4阻害薬とビッグアニド薬の配合剤である。
2. 本剤は各単剤による併用療法と比べ、服薬回数及び服薬錠数を軽減できる製剤である。
3. 薬価は 1錠 166.4 円。

フォシーガ錠 5mg

小野薬品工業

組成：1錠中 ダパグリフロジン 5mg

効能：2型糖尿病、1型糖尿病

用法：2型糖尿病

通常、成人にはダパグリフロジンとして5mgを1日1回経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら10mg1日1回に増量することができる。

1型糖尿病

インスリン製剤との併用において、通常、成人にはダパグリフロジンとして5mgを1日1回経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら10mg1日1回に増量することができる。

1. 本剤は1型糖尿病と2型糖尿病の両方に適応を有するSGLT2阻害剤である。
2. 本剤は食事の影響を受けないことから食前・食後のいずれでも投与可能な製剤である。
3. 本剤は2019年9月末日まで市販直後調査の対象品目となっている。（調査対象：1型糖尿病）
4. 薬価は 1錠 198.5 円。

【院外専用剤型追加医薬品】

アレグラドライシロップ 5%

サノフィ

1. アレグラ錠 30mg（院外専用採用）、フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「サワイ」（正規採用）は既採用。
2. 本剤は6ヶ月以上7歳未満の小児に対しても使用可能な製剤である。
3. 薬価は 1g 113.4 円。

ヒルドイドフォーム 0.3%

マルホ

1. ヒルドイドソフト軟膏 0.3%、ヒルドイドローション 0.3%は正規採用。
2. 本剤は高い展延性に優れ、広範な患部に素早く塗布できる製剤である。
3. 薬価は 1g 22.2 円。

【正規採用削除薬品】

アダラートカプセル 10mg

バイエル薬品

アムロジピン錠 5mg「日医工」

日医工

アラセナーA 点滴静注用 300mg

持田製薬

アンカロン注 150

サノフィ

エクジェイド懸濁用錠 500mg

ノバルティスファーマ

カバサール錠 1.0mg

ファイザー

カルグート錠 5

田辺三菱製薬

カロナール細粒 20%

あゆみ製薬

ケンエーハイポアルコール

健栄製薬

ゴナピュール注用 150

あすか製薬

シムジア皮下注 200mg シリンジ

アステラス製薬

注射用ソル・メルコート 125

富士製薬

注射用ソル・メルコート 500

富士製薬

注射用ソル・メルコート 1000

富士製薬

フェントステープ 8mg

協和発酵キリン

ボンビバ静注 1mg シリンジ

中外製薬

メチロン注 25% 1mL

第一三共

ラシックス細粒 40mg/g

サノフィ

【院外専用採用削除医薬品】

インターエアロゾル 1mg2%10mL

サノフィ

インター細粒 10%

サノフィ

ネシーナ錠 12.5mg

武田薬品工業

ブラダロン錠 200mg

日本新薬

メタクト配合錠 HD

武田薬品工業

ラジレス錠 150mg

オーファンパシフィック