

< あなたの治療について >





消・外 - BV/5-FU 持続/LV - 大腸 - 維持療法 - q2w

今回の治療は、BV/5-FU 持続/LV-維持療法という治療法で、アバステン（BV）、レボホリナート（LV）と 5FU という 3 種類の注射薬を併用して行います。アバステン、5FU は、共に腫瘍の増殖を抑えるお薬で、レボホリナートは 5FU の効果を増強させるお薬です。3 つの薬を組み合わせることで、より効果を高めることができます。

◎ 治療全体の流れ

今回の化学療法は 2 週間が 1 コースとなっています。各コースの 1 日目に点滴を行います。この治療を 2 週間（14 日間）ごとに繰り返します。副作用が強く出たり、体調がすぐれない場合は回復するまで、治療を延期したり、お薬の量を減らしたりすることがあります。

◎ 1 コース分の治療スケジュール

順序	薬剤商品名 (薬の作用)	投与	1 日目	2~14 日目
①	アバステン (抗がん剤)	点滴 約 30 分		お休み
②	デキサート (吐き気止め)	点滴 約 15 分		
③	レボホリナート (抗がん剤)	点滴 約 2 時間		
④	5-FU (抗がん剤)	点滴 約 48 時間		

★ 点滴中や点滴後に、注射部位が痛い、赤くなつてはれる、水ぶくれができる、ただれるなどの症状に気づいたときは、すぐに申し出てください。また点滴中は、腕を動かすことにより針がずれ、点滴漏れが生ずることがありますので気をつけて下さい。

◎特徴的な副作用について

アバスチンにおける

●ショック・アナフィラキシー様症状

「顔が赤く熱くなる、皮膚が痒い、蕁麻疹がでる、唇や舌・手足がしびれる、くしゃみ・咳が出る、気分が悪い、心臓がドキドキする、尿意や便意を生じる、喉がつまる、息が苦しい、目の前が暗くなる」などの症状

*** 投与時間は初回 90 分、2 回目 60 分、3 回目以降 30 分と短縮することがあります。**

●創傷治癒遅延

手術後の傷口の治りが遅れる

*** 手術の後、手術を行う場合は医師に確認してください。**

●高血圧

高血圧になることがありますので、治療期間中は定期的に血圧を測定することが大切です

●脳出血

「鼻血、歯ぐきからの出血；青あざができる；痰に血が混じる；吐き気、嘔吐；頭痛、突然のひどい頭痛；顔や手足の片側がしびれる」などの症状

5FUにおける

●激しい下痢

●重篤な腸炎

「水の様な下痢；2～3 日続く下痢；腹痛；トマトジュース様の下痢」などの症状


*** 上記症状が現れたときは、必ず医師・看護師・薬剤師にご相談下さい。**

◎副作用の発現時期の目安

* この図は、今回用いられている抗癌剤による副作用だけでなく、他の抗癌剤によって起こる副作用も含まれています。

これらの副作用がすべてあらわれるわけではありません。

また、発現する時期や程度も抗癌剤の種類や患者さんの体質により個人差があります。



◎副作用の対策について

★吐き気・嘔吐、下痢と便秘、口内炎、感染症、出血、貧血、脱毛などの副作用の対策について知りたい方は、資料をお渡しすることができますのでお申し出下さい。

◎薬品毎の副作用について（添付文書における重大な副作用を製薬会社作成「薬のしおり」などから抜粋）

まれな副作用ですが、このような症状が現れた際には医師・薬剤師・看護師へご相談下さい。

【アバステン】

〈消化管穿孔〉激しい腹痛、吐き気、おう吐、便秘、便に血が混じる（赤～黒っぽい便が出る）

〈創傷治癒遅延〉傷口が治りにくい、傷口が開く、傷口から出血する

〈消化管出血〉激しい腹痛、血を吐く、便に血が混じる（赤～黒っぽい便が出る）

〈肺出血〉痰に血が混じる、血を吐く

〈脳出血〉頭痛、吐き気、おう吐、片側の手足のまひ、強いしびれ、意識がもうろうとする

〈脳血管発作、一過性脳虚血発作、脳虚血、脳梗塞〉頭が重い、頭痛、吐き気、おう吐、しゃべりにくくなる、顔や手足のまひ、しびれ、めまい、意識がもうろうとする、視力が低下する

〈心筋梗塞、狭心症〉胸が痛い、胸が苦しい

〈高血圧性脳症、高血圧性クリーゼ〉頭痛、吐き気、意識がもうろうとする、けいれん

〈可逆性後白質脳症症候群〉頭痛、ぼんやりする、ふらつき、覚えられない、物忘れ、けいれん、しゃべりにくい、見えにくい、眼のかすみ、明暗がわからない、意識がなくなる

〈ショック、アナフィラキシー様症状〉寒気がする、冷汗が出る、手足がしびれる、立ちくらみ、呼吸困難、胸が苦しい、発疹、じんましん、かゆみ、むくみ、口唇やのどがはれる、血圧が下がる

〈粘膜出血〉鼻血が出る、歯ぐきから出血する、膣から出血する

〈深部静脈血栓症、肺塞栓症等の静脈血栓塞栓症〉片方のふくらはぎが赤く腫れたり、ふくらはぎを押すと痛む、急に息苦しく感じたり、胸苦しさを感ずる

〈ネフローゼ症候群〉尿の量が減る、体がだるい、疲れやすい、尿が出にくい

〈好中球減少症〉熱が出る、体がだるい、のどが痛いなどのかぜのような症状

〈うっ血性心不全〉息切れがする、胸が痛い、胸が苦しい

【レボホリナート】

〈下痢〉激しい下痢、脱水症状

〈腸炎〉出血性腸炎、虚血性腸炎、壊死性腸炎、激しい腹痛、下痢

〈白血球減少〉発熱、寒く感じる・ふるえ、喉の痛み

〈貧血〉疲れやすい、めまい、頭がふらふらする、皮膚や顔が青白い

〈血小板減少〉原因不明のあざ、歯茎からの出血、鼻血、月経量の増加、血がとまりにくい

〈ショック、アナフィラキシー様症状〉発疹、蕁麻疹、頻脈、ぜいぜいする

〈白質脳症、精神・神経障害〉歩行時のふらつき、四肢末端のしびれ感、舌のもつれ

〈心不全、心筋梗塞、狭心症〉手や足首のむくみ、息切れ、動悸、胸の痛み

〈肝機能障害、黄疸〉AST、ALT、ALP、 γ -GTP 上昇、黄疸

〈急性腎不全〉頭痛、尿量の減少、手や足首のむくみ、わき腹の痛み

〈間質性肺炎〉発熱、空咳、息切れ、呼吸困難

〈消化管潰瘍〉消化管潰瘍

〈口内炎〉重篤な口内炎

〈手足症候群〉手掌、足の紅斑、疼痛性発赤腫脹、知覚過敏

〈播種性血管内凝固症候群（DIC）〉循環不全による腎機能低下、呼吸不全など、凝固因子・血小板減少や線溶活性化による出血症状（粘膜出血、止血不良、脳出血など）

〈嗅覚障害〉においがわからない・しない

〈高アンモニア血症〉眠気、呼びかけに対する反応が悪い、けいれん

〈急性膵炎〉上腹部の痛み、吐き気、嘔吐

【5-FU】

〈脱水症状（激しい下痢）〉発熱、激しい腹痛、下痢、水様便、血便

〈腸炎〉発熱、激しい腹痛、下痢、水様便、血便

〈白血球減少〉発熱、寒く感じる、ふるえ、喉の痛み

〈貧血〉疲れやすい、めまい、頭がふらふらする、皮膚や顔が青白い
〈血小板減少〉原因不明のあざ、歯茎からの出血、鼻血、月経量の増加、血がとまりにくい
〈ショック、アナフィラキシー様症状〉発疹、蕁麻疹、頻脈、せいぜいする
〈白質脳症〉歩行時のふらつき、手足のしびれ、舌のもつれ
〈うっ血性心不全、心筋梗塞、安静狭心症〉手や足首のむくみ、息切れ、動悸、胸の痛み
〈急性腎不全〉尿量の変化、手や足首のむくみ
〈間質性肺炎〉発熱、空咳、息切れ、呼吸困難
〈肝機能障害、黄疸、肝不全〉倦怠感、食欲不振、右側腹部痛、眠け、皮膚が黄色くなる、白目が黄色味を帯びる
〈消化管潰瘍〉胸やけ、消化不良、腹部のさしこみ痛、タール状の便
〈激しい口内炎〉口内のただれ・痛み・出血
〈急性膵炎〉吐き気、嘔吐、背部痛、上腹部の激痛
〈意識障害を伴う高アンモニア血症〉眠気、呼びかけに対する反応が悪い、けいれん
〈手足症候群〉手のひらや足の裏の腫れ・痛み、皮がむける
〈味覚障害・脱失〉においかわからない・しない

- ◎ **上記のほかにも副作用が現れることがあります。**
他にもからだの異常を感じたら、主治医や薬剤師、看護師に相談してください。